




TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 66-69.

Renz (1948) estableció esta zona en el Grupo Agua Salada, como parte inferior del Piso Luciense Tardío, en Falcón oriental. Es concordante con la zona infrayacente de *Marginulinopsis bassispinosus* (Luciense Temprano) y con la Zónula suprayacente de *Vaginulinopsis superbus-Trochammina* cf. *pacífica*. Corresponde a parte del Miembro de Arcillas de Huso de la Formación Pozón. La zona fue mencionada posteriormente por C. Petzall (1959) y Vallenilla (1961) en la Formación Caujarao, y por Blow (1959) en el camino Pozón-El Mene de Acosta, quienes señalaron la dificultad de su reconocimiento fuera de la sección tipo debido a la influencia de factores ecológicos. De acuerdo con las determinaciones más recientes (Cati *et al.*, 1968) la zona corresponde al Mioceno Tardío.

Sinónimos parciales del término son la parte superior de la zona A-1 de Senn (1935) y la parte superior de la zona 4 de Cushman y Renz (1941).

Referencias

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1941. New Oligocene-Miocene foraminifera from Venezuela. *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17-1(224): 1-27.

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 2(10): 269-320.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Mem.* 32, p. 219.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Vallenilla L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 4(12): 29-78.

Enviar Comentarios



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)