

**NEOGENO (Mioceno medio)**

Estado Falcón

**Referencia original:** C. González de Juana, 1937.

El nombre fue publicado por primera vez por González de Juana (1937), para designar un intervalo arenoso que formaba el tope de la Formación Socorro en el área de Cumarebo. Payne (1951) lo considera como el miembro superior de su Formación Mosquito, nombre que no tuvo aceptación, añadiendo que era el equivalente lateral, al este, de la Caliza de Dividive. Weingeist (LEV I, 1956) y Dusenbury (LEV I, 1956) consideran al Miembro de Arenas de San Francisco como la unidad intermedia de la Formación Socorro en el área de Cumarebo, entre los miembros Mosquito, por debajo y Portachuelo, por encima. Giffuni *et al.* (1992) sustituyen el nombre de Formación Socorro en el área de Cumarebo por el de Formación Agua Salada según el concepto de Díaz de Gamero (1985b). La Formación Agua Salada incluye aquí las arenas de San Francisco. Se recomienda asignarle categoría informal, al igual que las otras unidades más antiguas incluidas dentro de la Formación Agua Salada en esta región.

El miembro tiene su localidad tipo cerca del pueblo de San Francisco, 5 km al sureste del campo de Cumarebo y consiste de areniscas blandas, de grano fino, ligeramente micáceas, con restos vegetales fósiles, de unos 100 m de espesor cerca de la localidad tipo. Corresponde a la arena mas potente y productiva del campo de Cumarebo, identificada como arena 15 (Payne, 1951). Giffuni (1980), bajo la identificación errónea de arenas de Las Lomas, las describe como areniscas limosas de color marrón naranja interestratificadas con lutitas marrones. Los cuerpos de arena son muy friables, sin estructuras sedimentarias ni estratificación observables en el campo. Petrográficamente corresponden a grauvacas líticas. El espesor medido fue de 344 m. La edad, determinada en base a foraminíferos planctónicos, es de Mioceno Medio, parte tardía, Zona de *Globorotalia mayeri*.

Las arenas de la Formación Agua Salada, de las cuales se discriminan 16 en el subsuelo del campo de Cumarebo, fueron productoras de hidrocarburos en esa región. La arena 15, la mas gruesa, se identifica con la Arena de San Francisco de la superficie (Payne, 1951).

Díaz de Gamero (1996) interpreta las arenas de San Francisco como clásticos de agua profunda, derivados de la parte superior del sistema deltaico representado por la Formación Socorro, al oeste. Este sistema deltaico fue construido por el río proto-Orinoco, que drenaba la Cordillera Central de Colombia, al oeste, y el Macizo Guayanés, al este, y fluía hacia el norte, desembocando en Falcón occidental.

Véase [AGUA SALADA, Formación](#); [SOCORRO, Formación](#); [MOSQUITO, Formación](#).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

**Referencias**

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venezolana Geol., Bol.*, 46:7-15.

Gonzalez de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 35(8): 1850-1878.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                   |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)