

**PALEOZOICO TARDIO**

Estados Táchira, Mérida y Trujillo

**Referencia original:** V. Oppenheim, 1937-a, p. 41.

**Consideraciones históricas:** Oppenheim (1937) propuso el nombre Grupo Sabaneta, para designar una unidad supuestamente cretácica. Kündig (1938) mencionó la presencia, por debajo del Grupo

Palmarito, de un intervalo de areniscas muy duras, rojas a verdosas, llamado no oficialmente Grupo Sabaneta. Kehrer (1938) llamó Grupo o Serie Sabaneta, a una secuencia igualmente paleozoica. Liddle (1946) atribuyó la Serie Sabaneta al Paleozoico. Sutton (1946) mencionó el nombre en el sentido original de Oppenheim. González de Juana (1951), llamó Formación Sabaneta, a la secuencia infrayacente a la Formación Palmarito. Pierce *et al.* (1961) describieron la unidad detalladamente en trece localidades en los Andes Venezolanos. Las Compañías Shell y Creole (1964) aportaron información adicional sobre la unidad, y la dividieron en dos miembros, descritos posteriormente en detalle por Arnold (1966).

**Localidad tipo:** Camino de Santa Bárbara de Barinas a Mucuchachí, en una desviación hacia el este que pasa por Palmarito y La Aguada, estado Mérida. Hoja 5939 a escala, 1:100.000 de Cartografía Nacional. Arnold (1966) propuso como sección de referencia, aquella que aflora en el curso inferior del río Aricagua, afluente del Caparo, la cual según dicho, es más completa que la sección tipo.

**Descripción litológica:** La Formación Sabaneta es una secuencia de areniscas gruesas a guijarrosas, de color gris a marrón, que pasan hacia arriba a una intercalación de limolitas y areniscas de color rojo a rojo violeta. El miembro inferior (Clástico, Arnold, 1966) consiste de areniscas macizas de grano grueso a guijarrosas, de color amarillento a marrón, con cantidades menores de lutita carbonácea gris; la mayoría de las areniscas muestra estratificación cruzada de ángulo alto; hacia la parte superior del miembro hay un nivel conglomerático con cantos de granito, cuarcita y cuarzo, en capas de hasta 15 metros de espesor. El miembro superior (de capas rojas de Arnold, 1966), es una intercalación de areniscas marrones a rojas y limolitas de color rojo violeta; hacia el tope, aumenta la fracción fina y la unidad pasa transicionalmente a sedimentos limosas y calcáneos de la Formación Palmarito.

En las cercanías de Mérida, la Formación es una brecha de peñones de 900 m de espesor, recubierta por una secuencia de areniscas y conglomerados, con secuencias de afinamiento hacia arriba; la brecha contiene abundantes bloques angulares de filitas de la Formación Mucuchachí. En algunas localidades, la unidad exhibe metamorfismo de bajo grado, con el desarrollo de pizarras en los intervalos de grano fino. Algunos diques de dolerita y diorita cortan la formación en diversos sitios.

Marechal (1983), señala que la unidad se dispone en dos bandas paralelas a la cadena: una al norte del río Chama y la otra al sur de Mucuchíes; la banda ubicada al norte del Chama o facies septentrional, llamada facies Mérida, se distingue de la banda, al sur de Mucuchíes, por su carácter más grueso y brechoide.

**Espesor:** En la sección del río Aricagua, se mencionan espesores de hasta 3.360 m, probablemente el mayor conocido para la unidad (Compañía Shell y Creole, 1964; Arnold, 1966).

**Extensión geográfica:** La unidad aflora esporádicamente en los andes; los mejores afloramientos se encuentran ubicados en una franja de unos 12 km de ancho, al norte del río Caparo. Otras áreas de afloramientos se encuentran en los alrededores de la ciudad de Mérida, carretera hacia Jají y en la carretera que va del Páramo de La Negra hacia La Grita, estado Táchira.

**Expresión topográfica:** Generalmente no presenta rasgos topográficos marcados, salvo a aquellas zonas donde es cortada por ríos donde forma gargantas profundas (garganta del río Boconó, estado Trujillo).

**Contactos:** La unidad es discordante sobre rocas del Paleozoico inferior. El contacto superior se mencionan como transicional a la Formación Palmarito; cerca de Mérida existe un contacto de falla con la Formación La Quinta del Jurásico.

**Fósiles:** En la parte superior de la unidad se han mencionado concreciones de algas. Arnold (1966) cita el hallazgo de un molde externo de gasteropodo (Molusco), en la sección del río Boconó, a unos 270 m por encima de la base de la Formación. Investigaciones palinológicas realizadas en la unidad, arrojaron resultados positivos.

**Edad:** En base a las determinaciones palinológicas y a su posición por debajo de la Formación Palmarito, la unidad es considerada de edad Carbonífero Superior-Pérmico Inferior.

**Correlación:** Las correlaciones de la unidad no son del todo claras. Según Shagam (1977) sería un equivalente lateral de la Formación Mucuchachí (Marechal, 1983). La pretendida correlación con la Formación Tinacoa no es válida, ya que esta última unidad es mesozoica (Odremán y Benedetto, 1977).

**Paleoambiente:** La Formación Sabaneta, es una formación terrígena de origen continental, caracterizada por marcados cambios de facies, y se relaciona en su distribución, con su carácter de depósitos Piemontinos en forma de cuña, que se adelgazan rápidamente.

**Importancia económica:** Ninguna.

**Sinonimia:** La unidad es Sinonimia de Grupo o Serie Sabaneta. Asimismo, su parte superior es sinonimia de Facies Mérida.

© O. Odremán y A. Useche C., 1997

## Referencias

Arnold, H. C., 1966. Upper Paleozoic Sabaneta-Palmarito Sequence of Mérida Andes, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 50(11): 2366-2387.

Compañía Shell de Venezuela and Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic Yocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 48(1): 70-84.

González de Juana, C., 1951-a. Introducción al estudio de la geología en Venezuela. Capítulo 1: Geología de los andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo 2: Las formaciones Paleozoicas de Venezuela Occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el Estado Táchira, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 44-56.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-55.

Kundig, E., 1938-a. Las Rocas Precretáceas de los andes centrales de Venezuela, con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43.

Kundig, E., 1938-b. The pre-Cretaceous rocks of the central Venezuelan Andes with some remarks about the tectonics. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. 2. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. y., 890 P.

Marechal, P., 1983. Les Temoins de Chaîne Hercynienne Dans le Noyau Ancien Des andes de Mérida (Venezuela). Structure et evolution tectonométamorphique. *These de Doctorat de 3eme cycle. Univ. de Bretagne Occidentale. Brest*, 1983.

Odremán, R., O. y J. L. Benedetto, 1977. Paleontología y Edad de la Formación Tinacoa de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *V Congr. Geol. Venez.*, Mem 1: 15-32.

Openheim, V., 1937-a. Contribución a la Geología de los andes venezolanos. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-45.

Pierce, G. R., C.C. Jefferson and W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic Localities in Mérida, Venezuela. *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 45(3): 342-375.

Shagam, R., 1977. Stratigraphic models for the northern venezuelan andes. Mem., *V Congres. Geol. Venez.*, 2: 855-877.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 30(10): 1621-1741.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucachachí a Santa Bárbara dans les Andes vénézuéliennes, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-415.

Openheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-45.

Schürmann, H. M. E., 1939. Das Alter der Massengesteine der venezolanischen Anden, *Neues Jahr. Min. Geol. Palaonto.*, Beil-Bd. 75, Apt. A, (1): 24-53.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189. Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                    |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)