

## CRETACICO

Estado Táchira

Kehrer (1938-a, b) dividió la secuencia cretácea expuesta en Los Andes surorientales en cuatro "facies" vagamente definidas, que llamó Ortiza (calcárea), Navay (ftanítico-arcillosa), Santa Bárbara (ftanítico-arenosa) y Quiú (arenosa-arcillosa). Según Pierce (1960) estas unidades no son delimitables y gradan indefinidamente entre sí. El término es inválido además por homonimia con otras unidades descritas en Venezuela occidental.

**Referencias**

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el estado Táchira. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, II(2-4): 44-56.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the States of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), II(2-4): 44-55.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

**Bibliografía de Léxicos Anteriores**

Kehrer, L., 1937. Algunas observaciones en capas cretáceas y pre-cretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 49-74.

Liddle, R A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

[Enviar Comentarios](#)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 1st Ed. English                                                                     | Comentarios Recibidos                                                                |

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)