




MESOZOICO

Estado Aragua

Referencia original: R. Shagam, 1960, P. 605.

Consideraciones históricas: Shagam (1960), introdujo el término Formación Santa Isabel, para designar a la unidad superior del Grupo Villa de Cura. Konigsmark (1966) y Oxburgh (1965), aceptaron la

posición estratigráfica de la formación, pero Seiders (1965), la colocó en la base del grupo, debido a que en Miranda central, muestra un grado mayor de metamorfismo. Piburn (1968), describió la unidad y siguió el orden establecido por Shagam. Navarro (1983) presenta un estudio geoquímico y petrográfico, correlacionándola con su [Unidad de Granofels](#). Girard (1981), Navarro (1982) y Beets *et al.* (1984), comentaron el carácter de volcánicas ácidas e intermedias metamorfizadas, de las rocas que la componen.

Localidad tipo: Hacienda Santa Isabel, distrito Zamora del estado Aragua, a unos 3 km al noroeste de San Juan de los Morros, en la confluencia entre la quebrada Las Minas y el río Guárico (Hoja 6746, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Según Piburn (*op. cit.*), los mejores afloramientos se encuentran en la quebrada Dos Hermanos, al noreste de San Sebastián, a unos 14 km al este de la localidad tipo.

Descripción litológica: Shagam (*op. cit.*) en la descripción original de la unidad, menciona rocas cuarzo albíticas, esquistos cloríticos, metaftanitas, metalavas y tobas, metadioritas y guijarros. En las cuarzo albíticas, incluye la granulita cuarzo albítica de color verde claro a amarillento, formada por albita, en porfiroblastos moderadamente maclados y cristaloblastos no maclados, clorita (pernnina), epídoto, anfíboles (actinolita y alaucofano) y cuarzo en porfiroblastos con moscovitas y estilpnometano, como accesorios. Además, están los esquistos epidótico-clorítico-cuarzo-albíticos y los esquistos epidóticos-cuarzo-albítico-glaucofánicos o gneises glaucofánicos, de composición general, similar a las granulitas.

Los esquistos cloríticos están sumamente plegados, son de color verde a verde oscuro, se presentan en capas de 10 a 50 cm, formando secuencias de hasta 50 m de espesor. Están formados por clorita permítica, con epídoto, anfíbol, cuarzo y albita en menor proporción.

Las metaftanitas son rocas laminadas y afaníticas, de color verde claro, variando a azul o negro. Están formadas por cristales diminutos de cuarzo con albita, actinolita, clorita y algo de glaucofano. Piburn (*op. cit.*), menciona filitas hematíticas en la mitad inferior de la formación, conteniendo hasta un 40% de hemalita especular en agujas.

Las metalavas son basaltos porfíricos verde-azulado y moteados, debido a la presencia de fenocristales de augita en un intercrecimiento de actinolita, clorita y albita. Forman fluhos de 1 a 5 m de espesor.

La metadiorita es de color verde oscuro y se presenta en cuerpos tabulares de 1 a 3 m y está formada por albita, augita, epídoto y clorita, además, actinolita y glaucofano, con muscovita y estilpnometano como accesorios.

Shagam (*op. cit.*), describe peñones y guijarros redondeados, distribuidos en las rocas cuarzo-albíticas. Son de color verde a verde amarillento y presentan cierta alineación con sus ejes mayores, subparalelos al buzamiento de las rocas que los contienen. Son de composición cuarzo albítica, en ciertos casos marcadamente vesiculares y de origen volcánico. Piburn (*op. cit.*), menciona también en los guijarros, así como otros formados por ftanita gris y los que define como conglomerados volcánicos de color verde oscuro, formados por fragmentos muy angulares de hasta 2 mm, en una matriz fina sin estratificación.

Espesor: Se ha estimado un espesor de alrededor de 1.200 m, aunque el intenso plegamiento dificulta mediciones confiables. Según Piburn (*op. cit.*), en el Guárico, la sección expuesta llega a los 4.000 m.

Extensión geográfica: La unidad aflora en la parte oriental de Carabobo, Aragua central, norte del Guárico y parte central de Miranda.

Contactos: La Formación Santa Isabel yace sobre la Formación El Carmen, en aparente contacto concordante. En el tope, la formación es discordante bajo la Formación Tiara.

Fósiles: No se han encontrado.

Edad: Mesozoico, sin diferenciar.

Correlación: Dada la naturaleza alóctona del Grupo Villa de Cura, no se ha podido establecer una correlación satisfactoria de las unidades que lo forman, con otras de la Cordillera de la Costa.

© **P. Jam L., 1997**

(Actualizado por: F. Urbani, julio 1997)

Referencias

Beets, *et al.*, 1984. ??????????????????

Girard, D., 1981. Pétrologie de quelques séries spilitiques mésozoïques du domaine Caraïbe et des ensembles magmatiques de l'île de Tobago. Univ. de Bretagne Occidentale, Brest, Tesis de doctorado de 3er. ciclo, 229 p.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

Navarro, E., 1983. Petrología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo Villa de Cura. *Revista Geos*, Caracas, 28: 170-317.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Piburn, M. D., 1968. Metamorfismo y estructuta del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.

Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.

Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formations of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260.

Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Menéndez, V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 64(1): 41-64.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)