

TERCIARIO (Mioceno)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 50-55.

Esta es una de las zonas establecidas en el Grupo Agua Salada, estado Falcón, por H. H. Renz (1948). Suprayace a la Zona de *Robulus wallacei* e infrayace la de *Marginalinopsis bassispinosus*. La zona fue mencionada posteriormente por Blow (1956, 1959) y por Petters y Sarmiento (1956). El primero señaló su equivalencia con zonas planctónicas extendidas desde la de *Globigerinatella insueta* hasta la de *Globorotalia fohsi fohsi*. Según criterios más recientes este intervalo corresponde al Mioceno Temprano a Medio.

Referencias

Blow, W. H., 1956. Origin and evolution of the foraminiferal genus *ORBULINA* d' Orbigny. *Micropaleontology*, 2(1): 57-70.

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Petters, V. y S. R. Sarmiento, 1956. Oligocene and Lower Miocene biostratigraphy of the El Carmen-Zambrano Area, Colombia. *Micropaleontology*, 2(1): 7-34.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces