


**CRETACICO** (Maastrichtiense Temprano)

Estado Zulia

**Referencia original:** J. M. Sellier de Civrieux, 1952, p. 235.**Consideraciones históricas:** Según Sellier de Civrieux (1952), la Caribbean Petroleum Company diferenció encima de la caliza de La Luna, una unidad litológicamente similar a ésta, en la base de dicha

unidad se encontró una delgada zona glauconítica. Posteriormente, esta unidad fue llamada "caliza basal de Colón" por los geólogos de la Schell-Caribbean. Hedberg (1937) expone la existencia de una sección estratigráficamente condensada en la parte inferior de la lutita Colón; geólogos de la Creole Petroleum Corporation encontraron evidencias de la existencia de esta pequeña sección de caliza en contacto con la Formación La Luna, en secciones del Cretácico Superior del subsuelo y de la superficie. Estos geólogos juzgaron conveniente designarle un nombre a la unidad, proponiendo el nombre de "Miembro de caliza Socuy de la Formación Colón", pero fue nombrada formalmente por Sellier de Civrieux (1952), quien la designó miembro Socuy.

**Localidad tipo:** Se encuentra en el [río Socuy](#), sierra de Perijá. Hoja 5748, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

**Descripción litológica:** El Miembro Socuy consta de 40 m de caliza margosa de colores claros con intercalaciones muy escasas de lutitas, que suprayace 2 a 3 m de caliza glauconítica que Ford y Houbolt (1963) consideran como el Miembro Tres Esquinas y otros autores incluyen en el Miembro Socuy (González de Juana, *et al.*, 1980). Ford y Houbolt (*op. cit.*) indican que las calizas del miembro en sección fina, muestran matrices de grano muy fino y calcilutíticas, con conjuntos de foraminíferos tanto pelágicos como bénticos. Las calizas del Miembro Socuy se distinguen de las calizas de la Formación La Luna por la presencia de foraminíferos bénticos, el color más claro de la matriz y la ausencia de laminación (González de Juana, *et al.*, 1980).

Wyant *et al.*, (1952, en González de Juana, *et al.*, 1980) en una sección del área de Chejendé desde la Formación La Luna hasta la Formación Colón, describen el "intervalo radioactivo" en la base de Colón, con un espesor de 1,5 a 4 m, formado por arcilla limosa muy liviana y suave de color claro al meteorizar, crenulada, negra a marrón oscura cuando fresca con abundante contenido de plantas y fósiles de vertebrados y con 0,007% equiv/U (no son apreciablemente radioactivas).

**Espesor:** El [Miembro Socuy](#) según Sellier de Civrieux (1952) tiene 42,50 m en su sección tipo, incluyendo 2,5 m de caliza glauconítica basal, presenta espesores de 30,5 m en el campo Mara; 9,5 m en Alturitas-1; 7,6 m en Alturitas-2; este adelgazamiento continúa hacia el sur. En la Concesión Barco sólo se conocen 2 a 5 m del miembro (González de Juana *et al.*, 1980).

**Extensión geográfica:** Perijá y subsuelo de las áreas vecinas.

**Contactos:** No se observa discordancia entre la Formación La Luna y la base de la Formación Colón (Miembro Socuy). Suprayace concordantemente al Miembro Tres Esquinas, e infrayace a las lutitas de la Formación Colón.

**Fósiles:** En el subsuelo de Alturitas, Key (1960) menciona la presencia de la Zona de *Bolivinooides decoratus* en los primeros 67 a 91 m de la Formación Colón, la zona siguiente es la de *Pullenia cretacica* cuyo conjunto faunal se reconoce en los 670 m siguientes y en los últimos 119 m aparece la Zona de *Siphogenerinoides bramlettei*.

**Edad:** La edad del Miembro Socuy fue establecida por Sellier de Civrieux (1952) como Maastrichtiense Temprano o Campaniense Tardío, basándose en la edad de la Formación La Luna infrayacente. Martínez (1989) le designa una edad Maastrichtiense.

**Paleoambientes:** Sellier de Civrieux, (*op. cit.*) señala que el contenido microfaunal de las lutitas del Miembro Socuy, con gran predominio de *Lagenidae* indica un ambiente deposicional de aguas moderadamente profundas, menor de 500 m, ambiente que se va haciendo relativamente más profundo con el principio de la deposición de las lutitas Colón. Martínez (1989) estima que el miembro se depositó en un ambiente de aguas profundas, basándose en la relación de foraminíferos planctónicos/bénticos junto con la alta proporción de formas con quillas.

Véase [COLON, Formación](#); [CUJISAL, Miembro](#).

© V. Savian, 1997

## Referencias

Ford R. y J. J. H. T Houbolt, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental. Internat. Sed. Petrog. Serv. E. J. Brill (Leiden), Holanda. 6: 67 p., 109 lám. Resumen (1966) en *Asoc. Venez. Geol., Min., y Petról.*, Bol. Inform., 6(5): 151.

González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 73-112.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 3: 511-545.

Martínez R., J. I., 1989. Foraminiferal biostratigraphy and paleoenvironments of the Maastrichtian Colon mudstones of northern South América. *Micropaleontology*, 35(2): 97-113.

Personal Técnico de la Shell Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil fields of Royal Dutch Shell Group in western Venezuela. *Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol.*, 32(4): 518-628.

Sellier de Civrieux, J. M., 1952. Estudio de la microfauna de la sección-tipo del miembro Socuy de la Formación Colón, distrito Mara, estado Zulia, *Boll de Geol.* (Venezuela), 2(5): 231-810.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutoh-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

## Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cushman, J. A. and H. D. Hedberg, 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Santander del Norte, Colombia, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17: 79-100, pt. 4.

González de Juana, C., 1952. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. de Geol.* (Venezuela), 2(5): 311-330.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55(10): 1165-1216.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo district, Venezuela, *3rd. World Petrol. Cong.*, Pr., Seetion I, p. 66-71.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoe. Petrol Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Comentarios



2a Edicion LEV



1st Ed. English



Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)