




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Falcón

Referencia original: C. González de Juana, 1937-a, p. 208.

Consideraciones históricas: González de Juana (1937-a, b), designó con este nombre, a una sección de areniscas expuestas al sureste del campo de Cumarebo. Payne (1951), la consideró como miembro de su Formación Ricoa. Weingeist (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*) le reconoció nuevamente rango formacional, forma en que aparece en el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano de Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petról., 1963). Wheeler (1960, 1963), mencionó también la unidad.

Localidad tipo: Cerro Solito, ubicado unos 8 km al sur de la Soledad, distritos Zamora y Colina, estado Falcón; Hoja N° ????, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La unidad está constituida por areniscas de grano fino y medio, friables, aunque generalmente endurecidas por la acción de agentes atmosféricos, sobre el óxido de hierro contenido en ellas, con motas blancas, posiblemente restos de feldespatos alterados y con pecas oscuras, producto de oxidación. González de Juana (1937-a, b), indica que areniscas muy similares a las descritas, se encuentran también en horizontes infrayacentes, intercaladas con arcillas laminadas de color violáceo y rojo púrpura, y que la diferenciación de estas areniscas del paquete llamado Solito, es poco menos que imposible.

En la terminación occidental de la fila de Solito, a lo largo de la carretera Guaibacoa-Solito-Pueblo Nuevo, la unidad está constituida por paquetes lenticulares de arenisca de espesor variable entre 45 y 120 cm y lutitas fisiles. Las areniscas son gris claro, de grano fino a medio, escogimiento moderado, alta densidad de empaquetamiento y con cemento silíceo-ferruginoso. Las lutitas son de color gris oscuro a negro, fisiles, finamente laminadas, con yeso, jarosita y manchas de óxido entre láminas; meteorizan en marrón rojizo-violáceo, y en forma irregular se presentan concreciones y capas de nódulos de arcilla, yeso y óxidos de hierro (González de Juana *et al.*, 1980).

En forma muy sucinta, Wheeler (1960, 1963) describe la Formación Solito como una sección de lutitas, limolitas y arcillas arenosas con delgados hilos de arenisca sin consolidar.

Espesor: Wheeler (1963), indica que el espesor de la Formación Solito es de aproximadamente 300 m. Según González de Juana *et al.* (*op. cit.*), el espesor total de la formación es desconocido; sin embargo, estos autores mencionan un espesor de 375 m para la sección de la terminación occidental de la fila de Solito.

Extensión geográfica: La unidad cubre grandes extensiones al sur de río Ricoa y al sureste del campo de Cumarebo, en el distrito Zamora.

Contactos: Los contactos de la sección son de aparente concordancia (L.E.V. II, 1970).

Fósiles: González de Juana (1937-a, b) menciona ejemplares mal conservados de *Pecten* sp. y *Cardium* sp. y moldes de *Turritella* sp.

Edad: De acuerdo al L.E.V. II (*op. cit.*) correlaciones estratigráficas sitúan la formación en el Mioceno Medio. González de Juana *et al.* (1980), la consideran del Mioceno Temprano, por correlación con la Formación Agua Clara.

Correlación: Para Wheeler (1960, 1963), la unidad es equivalente lateral de la Formación Cerro Pelado, González de Juana *et al.* (*op. cit.*), consideran que la Formación Solito se presenta en aparente continuidad lateral con lutitas de la Formación Agua Clara.

Paleoambientes: Foraminíferos bentónicos presentes en las lutitas, indican un ambiente de depositación de aguas turbias de por lo menos 450 m de profundidad (González de Juana *et al.* 1980).

Referencias

- González de Juana, C., 1937-a. Geología General y Estratigrafía de la Región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1 (2-4): 197-217.
- González de Juana, C., 1937-b. General Geology and Stratigraphy of Cumarebo Area, State of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1 (2-4): 187-205 (Ed. en inglés).
- González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ed. FONINVES, 1: 362-363.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 756 p.
- Payne, A. L., 1951. Cumarebo Oil Fields, Falcón, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 35(8): 1850-1878.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).
- Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón occidental y nororiental. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem. 1: 407-465.
- Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res., Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.
- Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.
- Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcón (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)