




NEOGENO (Plioceno)

Estado Falcón

Referencia original: A. Molina y R. Pittelli, 1988, p. 51.

Consideraciones históricas: Molina y Pittelli (1988) crearon este nombre formacional para distinguir la unidad superior del Grupo La Puerta; los autores describieron la litología distintiva, espesores, contenido fósil y edad, estableciendo su estratotipo.

Localidad tipo: Ubicada a lo largo de la carretera que une al poblado de Bariro con la entrada del campo Tiguaje, 20 km al suroeste de Dabajuro. Hoja No. 6048 de Cartografía Nacional, escala 1:100.000.

Descripción litológica: Las secciones estudiadas en superficie son incompletas y representan una pequeña sección de la parte inferior de esta formación. Esta fracción consiste de arcilitas generalmente masivas, de color gris claro o rojizo según el contenido de material ferruginoso. Pueden ser muy limosas y ocasionalmente jarosíticas. Tienen espesores variables entre 1,50 m a 50 m. Presentan intercalaciones de hasta 5 m de areniscas friables, de color gris claro, de grano medio a fino en la base y fino hacia el tope, donde se encuentran abundantes niveles ferruginosos y capas delgadas de limolitas y lutitas. Los contactos entre capas de areniscas y lutitas son abruptos y pueden ser paralelos a la estratificación o erosivos. Pueden presentar laminación convoluta, estratificación cruzada de ángulo bajo y lentes de arcilla de 10 a 30 m de espesor por 4 m de ancho.

Espesor: En el bloque de Dabajuro presenta un espesor promedio de 452 m (pozos QMD-1X, QMC-1X, DGE-1X, Zamuro-1X AMF-1X y El Callao-1X); el espesor aumenta progresivamente en las direcciones norte y este a partir del límite con la falla de Oca. Al sur de esta falla, el espesor promedio es de 698 m (pozos EM-285, SC-IX AMN-IX, AMN-2X AMM-1X, Altosano-1X, Altosano-2X, La Guinea-1X, Tig 1-41X, Tig 1-42X, LAD-3X, Berj-5X y Macunare-IX). Hacia el este del campo Tiguaje la formación desaparece completamente, debido a control tectónico. Los espesores medidos en superficie son incompletos y representan tan solo una pequeña sección, correspondiente a la parte inferior de esta formación.

Extensión geográfica: La Formación Tiguaje fue identificada en secciones geológicas de superficie, realizadas en las localidades de Mene de Mauroa, Media, Hombre Pintado, Bariro y Tiguaje. Adicionalmente, esta formación ha sido identificada en casi todos los pozos que se encuentran al oeste de la falla de Capatárida y el poblado de Dabajuro, hasta el campo Mene de Mauroa.

Expresión topográfica: La Formación Tiguaje, de litología fundamentalmente lutítica, forma una llanura estrecha con pequeñas lomas, que se extiende entre la zona de colinas de la Formación Bariro, al sur, y la carretera Falcón-Zulia.

Contactos: El contacto inferior de la Formación Tiguaje es concordante con la Formación Bariro y está definido por la base de un paquete lutítico de espesor considerable (aproximadamente 30 m), que descansa sobre la última arenisca de espesor considerable (aproximadamente 1 m) perteneciente a la Formación Bariro. El tope de la formación infrayace discordantemente a las terrazas del cuaternario o está siendo erosionado.

Fósiles: La Formación Tiguaje es estéril de fauna. Presenta, entre otros, los palinomorfos: *Mauritidites franciscoi*, *Podocarpites* sp. y *Echitricolporites spinosus* (Muller *et al.*, 1985).

Edad: De acuerdo a los palinomorfos presentes, Muller *et al.* (1985) le asignan una edad Plioceno, Zona de *Echitricolporites spinosus*.

Correlación: La Formación Tiguaje se correlaciona con la Formación Codore hacia el este de Dabajuro. Hacia el oeste, en el estado Zulia, se correlaciona con la Formación La Puerta.

Paleoambientes: Molina y Pittelli (1988) interpretan un ambiente de llanura fluvial con canales de ríos de meandros, de muy baja energía.

La Formación Tiguaje, pasa gradualmente a ambientes próximos costeros y costeros hacia el noreste, en las cercanías de la falla de Capatárida. Esto se evidencia por la aparición y aumento gradual del contenido de restos biogénicos y material calcáreo.

Véase [LA PUERTA, Grupo](#).

© *A. Molina y R. Pittelli, 1997*

(Actualizado por: *María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997*)

Referencias

Molina, A. y R. Pittelli, 1988. Revisión geológica del Grupo La Puerta, Falcón occidental, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 32: 49-57.

Muller, J., E. de Di Giacomo y A. Van Erve, 1985. A Palynological zonation for the Cretaceous, tertiary and Quaternary of northern South America. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, S.V.G. 2: 1041-1080.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)