




TERCIARIO (Eoceno Medio)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y Pyre, 1944, p. 15-21.

Consideraciones históricas: En su sentido actual, el Miembro Tinajitas del área tipo consiste en 12 m de capas métricas de calizas biostrómicadas, compuestas de algas calcáreas (rodolitos),

foraminíferos orbitoidales, equinodermos y bivalvos, que se desarrollan en el tope de la Formación Caratas (Salvador, 1964-b; Galea, 1985). En la misma área, estas calizas pueden presentarse estratiformes *in situ*, o como olistolitos decimétricos a métricos, embebidos en el miembro olistostrómico basal de la Formación Los Jabillos, suprayacente (Vivas en Macsotay *et al.*, 1986). En el río Querecual, el horizonte de calizas está reemplazado por un horizonte más terrígeno de marlitas nodulares, limosas, finamente laminadas con concreciones de caliza glauconítica; entre los ríos Querecual y Amana, el miembro aumenta a 30 m de espesor, de limolitas, areniscas glauconíticas, calcáreas seguidas de calizas arenáceas muy glauconíticas, en capas métricas (Miembro Limón, *fide* Rosales, 1960). En las cabeceras del río Amana, en el flanco norte del sinclinal de El Banco, el miembro está representado por 120 m de calizas macizas, arenosas o bioclásticas (González de Juana *et al.*, 1980).

La inclusión de Tinajitas como miembro de la Formación Peñas Blancas (Galea, 1985) en base a su semejanza litológica y a su contemporaneidad, no fue aceptado por Macsotay *et al.*, (1986) y otros autores, por lo siguiente: 1) las dos calizas fueron depositadas en dos contextos y dos áreas distintas de la cuenca (CVET, 1970). 2) se hallan a lados opuestos de la Deflexión de Barcelona; y 3) la Formación Peñas Blancas es transgresiva, en relación de discordancia angular con unidades más antiguas de edad Cretáceo superior, Paleoceno y Eoceno inferior (CVET, 1970; Beck, 1977; Campos y Osuna, 1977 y Vivas y Campos, 1977), mientras que en el Miembro Tinajitas, es regresiva con respecto a la secuencia infrayacente de la Formación Caratas s.s.

Sinonimia. El Miembro Limón (Rosales, 1960) es sinónima.

Véase [CARATAS, Formación](#); [PEÑAS BLANCAS, Formación](#).

© O. Macsotay y V. Vivas, 1997

Referencias

- Beck, C., 1977. Geología de la faja piemontina y del frente de montañas en el noreste del estado Guárico, Venezuela septentrional. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 759-782.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. Geology of the Boca de Uchire region. Sociedad Venezolana de Geólogos, Caracas, Venezuela, V Congreso Geológico Venezolano, 1: 449-467.
- Galea, F., 1985. Bioestratigrafía y ambiente sedimentario del Grupo Santa Anita del Cretáceo superior-Eoceno, Venezuela nororiental, *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 703-710.
- González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.
- Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.
- Macsotay, *et al.*, 1986. ???
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.
- Rosales, H., 1960. estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(6): 153-202.

Vivas, V. y V. Campos, Geología del área del río Batatal. Estado Miranda, *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 349-362.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Borger, H. D., 1952. Case history of Quiriquire field, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 36(12): 2291-2330.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphy occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogenerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-476. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(12): 379.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Peirson III, A. L., 1965. Geology of the Guárico mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 8(7): 183-212.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of the Santa Anita Group and overling Merecure Group, Río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 5(4): 89-108.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)