

MIOCENO TARDIO

Estado Táchira-Colombia

Referencia original: James 1977, en Van Houten y James (1984)

Consideraciones históricas: Esta formación fue descrita en detalle por Van Houten y James (1984), como parte superior del Grupo Guayabo.

Localidad tipo: No se menciona localidad tipo.

Descripción litológica: Consiste de una secuencia espesa de conglomerados cuarzosos y con intercalaciones de areniscas de canales de grano grueso, seguida por una secuencia de lodolitas moteadas. Ocurren además, delgadas capas de oolitos y horizontes ligníticos de poco espesor.

Espesor: 450 a 1085 m.

Extensión geográfica: Alrededores de Cúcuta (Colombia) y en la parte sureste del lago de Maracaibo.

Contactos: Suprayace a la Formación Cornejo, y está recubierta en la parte superior, por sedimentos del Plio-Pleistoceno.

Fósiles: No se mencionan fósiles.

Paleoambientes: Al episodio de máxima progradación del delta del Guayabo se refleja en esta formación, y se observa un aumento en la tasa de levantamiento de la provincia distributiva y un aumento en la sedimentación en la región subsidente del lago de Maracaibo.

©N. Pimentel de B. y A. Bellizzia, 1997

Referencias

Van Houten, F. B. y H. James, 1984. Late Cenozoic Guayabo delta complex in southwestern Maracaibo Basin, northeastern Colombia. The Caribbean South American Plate Boundary and Regional Tectonics. *Geol. Soc. of América*, Mem., 162: 325-332.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)