

CRETACICO (Turonense?-Cenomaniense?)

Estado Miranda

Referencia original: V. Campos, S. Osuna y V. Vivas, 1980, p. 148.

Consideraciones históricas: Campos *et al.* (1980) propusieron el nombre Formación Uchire para distinguir a una secuencia conformada esencialmente, en la parte inferior, de paquetes de ftanita gris claro, en capas de hasta 30 cm, localmente calcárea que, en algunos lugares, rápidamente pasan lateralmente a lutita de tonos verdosos o gris claros que meteorizan a tonos rojizos; lajosa, silíceo, dura y fisil e intercalada con capas de ftanita. La parte media se compone de capas interstratificadas de conglomerados con bloques de arenisca, en un ambiente aparente de deslizamientos submarinos; contiene capas de arenisca turbidítica, cuarcítica, pirítica y gradada. Esta secuencia contiene capas de ftanita que sugiere una deposición lenta en ambiente euxínico, interrumpido esporádicamente por corrientes de turbidez.

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min.*, Caracas, 14(26): 137-196.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)