




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 69-70.

Renz (1948) estableció esta zónula en su división bioestratigráfica del Grupo Agua Salada, donde corresponde a la parte media del Miembro Huso de la Formación Pozón. Renz señaló que la fauna empobrecida se diferencia de la Zona de *Robulus senni*, infrayacente, por factores ecológicos, más bien que cronológicos, concepto apoyado por los estudios posteriores de Petzall (1959), Blow (1959) y Vallenilla (1961). Blow no pudo reconocer la zónula, pero colocó la Zona de *Robulus senni*, en sentido amplio, en sus zonas planctónicas de *Sphaeroidinella seminulina* y *Globigerina bulloides*, cuya edad según los criterios modernos, corresponde al Mioceno Tardío.

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(10): 269-320.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Vallenilla L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(12): 29-78.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)