


VENADOS, Miembro (Formación Barranquín)

VALIDO



CRETACICO (pre-Valanginiense)

Estado Sucre

Referencia original: E. Von Der Osten, 1954, p. 134.

Consideraciones históricas: El Miembro Venados es la inferior de cuatro subdivisiones de la Formación Barranquín, propuestas por Von Der Osten (1954, 1957-b). Su localidad tipo es la Isla Venados, en el

Archipiélago Guaiquerí-Manare, donde afloran 375 m de intercalaciones de asperones subconglomeráticos, en paquetes plurimétricos, intercalados con limolitas micáceas masivas. Rosales (1960) afirmó que este miembro sólo se reconoce en una "pequeña zona alrededor de su localidad tipo"; Macsotay *et al.* (1986) sostienen que este miembro se puede diferenciar en todo el dominio del archipiélago Guaiquerí-Manare, hasta el meridiano de Cumaná; Yoris (1985-a) reconoce al Miembro Venados en varias áreas del extremo oriental de la serranía del interior oriental.

Véase [BARRANQUIN, Formación](#).

© O. Macsotay y M. Wehrmann, 1997

Referencias

Macsotay, O., *et al.*, 1986. ???

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Oaleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Von Der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (Estado Sucre), *Boll de Geol.* (Venezuela), 3(8): 123-211.

Von Der Osten, E., 1957. Lower Cretaceous Barranquín Formation of northeastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 41(4): 679-708.

Yoris, V., F. G., 1985. Revisión de la Estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la serranía del interior, Venezuela nororiental. *VI Congr. Venezolano*, 2: 1343-1393.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.

Hedberg, E. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 28(1): 1-28.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Verenig. Schweiz. *Petrol. Geol. und Ing.*, Bull., 20(59): 27-60.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Maync, W., 1949. The foraminiferal genus CHOFATELLA Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México and Florida). *Eclog. Geol. Helv.*, 42: 529-547.

Rod, E. y Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 38(2): 193-283.

Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Royo y Gómez, J., 1960. Los vegetales de la Formación Barranquín, Cretácico Inferior del Estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 496-500.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge, and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)