

CRETACICO (Albiense-Cenomaniense)

Estados Portuguesa y Lara

Referencia original: V. Campos, *et al.*, 1973.

Campos *et al.*, (1973) introducen el nombre de Formación Volcancito para designar una secuencia de rocas ligeramente metamorfizadas que afloran en la serranía de Portuguesa, al sur de la falla de Boconó, estableciendo como localidad tipo la carretera San Miguel-Agua Negra, específicamente en las cercanías del caserío Volcancito; propusieron como secciones de referencia las que se observan en las carreteras Buena Vista-Capilla de Bucaral, Cubiro-Las Cuibas-Agua Negra y Cubiro-Río Turbio-Escaleras.

Campos *et al.*, caracterizaron la unidad desde el punto de vista petrológico de la siguiente forma: "En el área tipo pueden distinguirse dos franjas litológicas dentro de esta formación: La que está directamente al sur de la falla de Boconó, fundamentalmente calcáreas y la que forma las partes más elevadas de la serranía que se observa inmediatamente al sur de la mencionada falla y que se caracteriza por su predominio de cuarcitas. Debido al intenso plegamiento y fallamiento es difícil establecer la posición estratigráfica relativa entre dichas franjas. En la franja calcárea aparecen intercalaciones de calizas laminadas y masivas, filitas calcáreas. En la franja cuarzosa predominan las cuarcitas y las metareniscas con delgadas intercalaciones de filitas silíceas o calcáreas". Macsotay (en Campos *et al.*, 1979) menciona la presencia de diversas especies de Angiospermas, Antozoarios, Gasterópodos, Cephalópodos, Pelecípodos, Poliquetes e Icnofósiles, que sugieren una edad Albiense (?), base del Cenomaniense.

La presencia de fósiles de ambiente de plataforma (moluscos) y de plantas terrestres, junto con amonites (*idiohamites* sp) e icnofósiles de ambiente batial sugieren que la Formación Volcancito se depositó en aguas profundas, cercanas a la zona del talud, con invasiones periódicas de corrientes de turbiedad.

La Formación Volcancito es concordante y gradacional sobre la Formación Mamey. El resto de sus contactos son todos de falla, excepto cuando se presenta en forma alóctona dentro de las formaciones Río Guache o Yacambú.

Con base a evidencias paleontológicas (Macsotay, en Campos *et al.*, 1979) de las formaciones Bobare y Carorita, se plantea la correlación, tanto en ambiente como en edad de dichas unidades con Volcancito. También sería correlacionable con la parte superior del Grupo Cogollo, y también se podría considerar equivalente con la parte superior de la Formación Mamey y con las formaciones Cojedes y Chuspita.

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Campos, *et al.*, 1973. ????????????????????

Campos, V., S. Osuna y V. Guedez, 1979. Geología de la serranía de Portuguesa, estados Portuguesa y Lara. *Bol. Geol.*, MMH, Caracas, 13(25): 3-49.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)