


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: B. Korol, 1965, p. 8.**Consideraciones históricas:** Korol (1965) propuso éste nombre para designar la parte basal, constituida esencialmente de rocas sedimentarias de grano grueso de la Serie Pastora (hoy Supergrupo).

Kalliokoski (1965-a, c) describió la unidad con mayor detalle, tomó en consideración sus variaciones litológicas en escala regional y describió en ella rocas volcánicas ácidas como componentes principales. Menéndez (1968) redescubre la unidad, le asigna una nueva sección tipo y la encuentra suprayaciendo concordantemente al Grupo Carichapo, con el cual integra el Supergrupo Pastora. Espejo (1974) la reconoce en la región de El Manteco- Guri.

Localidad tipo: Sector del río Yuruari, situado entre un punto 1 km al este de la desembocadura de la quebrada Cicapra y otro unos 5 km al este del caserío de Pastora, municipio autónomo Roscio del estado Bolívar; Hoja N° 7738, de la Cartografía Nacional, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La litología es esencialmente un producto de volcanismo dacítico o riodacítico muy bien desarrollado en su parte media y superior donde contiene lavas, brechas y tobas, además de areniscas y limolitas feldespáticas de estratificación delgada (Menéndez, *op. cit.*; 1994). En la parte inferior contiene filitas manganesíferas y grafiticas de estratificación fina, interlaminada con limolitas feldespáticas y con filitas cloríticas. Las rocas epiclásticas de estratificación delgada a laminadas se presentan comúnmente en paquetes hasta de 5 m de espesor; están constituidas por metareniscas feldespáticas de grano fino a medio que gradan a metalimolitas y que alternan rítmicamente con láminas de filitas grises a negras, o con láminas de esquistos sericítico cloríticos. Metareniscas volcánicas son comunes en la parte media a superior de la sección expuesta de la unidad y están asociadas a tobas, brechas y lavas dacíticas en paquetes de hasta metros de espesor aparente. Las metalavas dacíticas contienen abundantes fenocristales de feldespato y de cuarzo. Espejo (*op. cit.*) encuentra una composición litológica semejante de la unidad en la región de El Manteco-Guri, y hace énfasis en que en la parte inferior hay mayor participación de material volcánico redepositado y que la presencia de estructuras turbidíticas sugiere que corrientes de turbiedad actuaron durante el depósito de esta parte de la secuencia.

La secuencia presenta plegamiento isoclinal, esquistosidad paralela a la estratificación y metamorfismo regional de intensidad variable dentro de la facies del esquistos verde y localmente metamorfismo térmico, hasta la facies de la corneana hornbléndica, en el contacto con rocas graníticas.

Ambiente tectónico y petrogénesis: La unidad es producto de vulcanismo esencialmente dacítico ocurrido al final del ciclo volcánico - sedimentario que dio origen a los cinturones de rocas verdes primarios de la Provincia Geológica de Pastora (Menéndez, 1994).

Contactos: Según Korol (1965) y Kalliokoski (1965-a), la unidad infrayace concordantemente a la Formación El Callao o en su ausencia a la Formación Caballape. Según Menéndez (*op. cit.*; 1994), en la región de Guasipati, la unidad suprayace con contacto transicional al Grupo Carichapo, el contacto es gradacional con la Formación Cicapra en la parte oeste de la región, en la parte noroeste y noreste, suprayace a la Anfibolita de Carichapo y en la parte sur a la Formación El Callao, donde Cicapra está ausente; infrayace a la Formación Caballape con discordancia angular. Localmente está intrusionada por el Complejo de Supamo y por intrusiones graníticas menores. En la región de El Manteco- Guri, Espejo señala que la unidad suprayace concordante y transicionalmente a las metavolcánicas básicas de Carichapo e infrayace concordantemente a la Formación La Cuaima y localmente está intrusionada por granitos jóvenes. El espesor máximo de esta Formación es acerca de 1.000 metros según Menéndez (*op. cit.*; 1972). Espejo (1974) calculó un espesor mínimo de 1.500 metros en la región de El Manteco - Guri.

Extensión geográfica: La unidad aflora irregularmente desde la frontera con Guyana al este, hacia la zona ubicada 30 kilómetros al oeste de Guasipati y a lo largo del río Caroní hasta las inmediaciones de La Paragua al Oeste y San Pedro de las Bocas al Este; también aflora en la parte noreste de la región Botanamo del estado Bolívar (Benaím, 1972).

Edad: Klar (1979, en Menéndez, 1994), determinó por U-Pb en circones procedentes de las lavas de la unidad, que afloran en el paso real de Pastora en el río Yuruari, que el vulcanismo dacítico de la Formación Yuruari tuvo lugar hace 2.200 ± 100 m.a.

Correlación: Martín, C. (1974), la considera equivalente al Grupo Caroní. Klar (*op. cit.*) señala que el vulcanismo dacítico de Yuruari y los plutones subvolcánicos de pórfido de cuarzo de Mandingal y Cerro Pelón que la intrusionan son comagmáticos.

Sinonimia: Formación Guasipati de Short y Steekem (1962) y Rocas Foliadas de Piedpa de McCandless (1966).

Importancia económica: La unidad ofrece buenas perspectivas en la búsqueda de oro, metales básicos (Cu, Pb y Zn) y manganeso (Benaím, 1972). Los metasedimentos feldespáticos de esta formación podrían constituir buenos depósitos de caolín por su bajo contenido de componentes ferruginosos.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Benaím, N., 1972. Geología de la región de Botanamo, estado Bolívar. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 3: 1291-1314.

Espejo, A., 1974. Guía de la excursión N° 3, Upata-El Manteco. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar. p. 68-83.

Espejo, A., 1974. Geología de la región El Manteco- Guri, estado Bolívar, Venezuela. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 207-248.

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 76(9): 1027-1050.

Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana. Venezuela. *Bol. Geol. Caracas*. 7(13): 29-104.

Korol, B., 1965. Estratigrafía de la Serie Pastora en la región Guasipati-El Dorado. (Presentado Cong. Cent. Col. Ing. Venez., 1961). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 3-17.

Martín B., C., 1974. Paleotectónica del escudo de Guayana. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 251-305.

McCandless, G. L., 1966. Geología general de la parte septentrional del Escudo de Guayana en Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 140-153.

Menéndez, V. de V. A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estudio de la región de Guasipati, Guayana venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338.

Menéndez, A., 1994. Cinturones verdes del escudo de Guayana en Venezuela. Revisión estratigráfica. *Simp. Internac. Oro Venezuela*, Caracas, p. 123-139.

Short, K. C., y W. F. Steenken, 1962. A reconnaissance of the Guayana Shield from Guasipati to the Río Aro, Venezuela. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, 5: 189-221.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)