

CRETACICO TARDIO

Estado Zulia

Referencia original: C. E. Key, 1960, p. 529-531.

Este término, publicado originalmente por Key (1960), ha sido utilizado informalmente durante muchos años para designar una unidad bioestratigráfica característica, presente en la parte superior de la Formación Colón, en gran parte de la cuenca del lago de Maracaibo. Según Key esta zona corresponde aproximadamente a la Zona de *Siphogenerinoides bramlettei* establecida por Cushman y Hedberg (1941) en el Departamento Santander del Norte, Colombia.

En el subsuelo de la región de Alturitas, Zulia occidental, el tope de la zona se distingue por la aparición de *Marginulina silicula* y *Loxostomum plaitum*. Key señaló además las siguientes especies como características de la zona: *Gümbelitra cretacea*, *Haplophragmoides excavatus*, *Planularia dissona*, *Siphogenerinoides bramlettei*, *Siphogenerinoides parvus*.

Referencias

Cushman, J. A. y H. D. Hedberg, 1941. New Oligocene-Miocene foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contrib., 17-1(224): 1-27.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., III: 511-545.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)