




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Distrito Federal

Referencia original: Weisbord, N. E., 1957, p. 20-21.

Consideraciones históricas: La Formación Abisinia forma parte del Grupo Cabo Blanco, el cual fue descrito por primera vez por Humboldt en 1801, quien hizo una descripción litológica de las rocas allí expuestas,

además mencionó la posible correlación de este grupo con formaciones de la misma edad en la Punta de Araya y Cumaná (Humboldt, Traducción Alvarado, 1991).

El área de Cabo Blanco, incluyendo los afloramientos de la Formación Abisinia, fue mapeada por Gabriel Dengo entre (Dengo, 1953) y posteriormente más detallada por profesores y estudiantes de la Escuela de Geología de la U.C.V (*fide* Weisbord, 1957).

El área fue [mapeada](#) en escala 1:25.000 por Norman Weisbord (1957), quien coleccionó una gran cantidad de fósiles para ayudar a determinar la edad del Grupo. Posteriormente Pedro J. Bermúdez y Angel Fuenmayor (1962) realizaron un estudio de los foraminíferos para correlacionar la formación con la zonación mundial de foraminíferos.

En 1971 Lourdes de Gamero y V. Hunter (*fide* Gibson-Smith, 1971), visitaron la zona por motivo de la ampliación del aeropuerto, durante la cual desaparecieron gran parte de los afloramientos del Grupo Cabo Blanco, en especial la Formación Abisinia.

Localidad tipo: La localidad tipo se encuentra cerca del caserío Abisinia, entre Maiquetía y Catia La Mar, en el Distrito Federal, 15 Km al norte de Caracas. Actualmente esta zona está urbanizada y quedan solo afloramientos esporádicos.

Descripción litológica: La Formación Abisinia consiste de arcillas, limolitas, areniscas y gravas, con algunos fragmentos de fósiles mal preservados. Las arcillas son oscuras hacia el oeste y de color gris claro hacia el este. Las areniscas son calcáreas de grano fino. Las gravas están compuestas por cuarzo, areniscas, esquisto, gneis mezcladas en una matriz de arena fina.

Espesor: El espesor de esta formación no supera los 13 m.

Extensión geográfica: La Formación Abisinia se extiende por unos 4 km aproximadamente, entre Punta Gorda al este y el Club Playa Grande al oeste, y desde el aeropuerto hasta la línea de costa, Weisbord (1957).

Expresión topográfica: Tanto la Formación Abisinia como las demás formaciones del Grupo Cabo Blanco, forman una colina alargada paralela a la costa, que es cortada por quebradas generalmente secas excepto durante la temporada de lluvia.

Contactos: La Formación Abisinia está en contacto discordante con la Formación Mare infrayacente. Sobre la Formación Abisinia se encuentran los sedimentos recientes en contacto discordante.

Fósiles: Los macrofósiles de la Formación Abisinia (gasterópodos, pelecípodos, escafópodos, serpulidos, cirrípedos y briozoarios) fueron estudiados por Weisbord (1962, 1964-a, 1964-b, 1965, 1967), de los cuales entre el 88% y 90% son especies que se mantienen en el Reciente. También fueron reportados algunos géneros de foraminíferos: *Bathysiphon*, *Textularia*, *Quinqueloculina*, *Nonion*, *Elphidium*, *Rotalia*, *Eponides*, *Discorbis*, *Amphistegirina*, *Globigerina*, *Globorotalia*, *Cibicides*, *Planulina*, *Cibicidella* y *Anomalina* (Weisbord, 1957).

Edad: Weisbord (1964-b) asigna una edad de Pleistoceno para la Formación Abisinia, basado en el método de "Determinación de Edad de Lyell", en base al porcentaje de especies aún vivientes que fueron encontradas como fósiles. Dataciones radiométricas por el método de U-Th efectuadas en conchas de gasterópodos, indicaron una edad de 300.000 años, lo cual es equivalente a Pleistoceno medio.

Paleoambientes: Las secuencias litológicas y los fósiles de la Formación Abisinia indican un ambiente inicial de deposición de sedimentos en el rango de las gravas y arenas, en parte derivados de un ambiente piemontino por medio de abanicos aluviales (las gravas son cuarzosas, con guijarros y gránulos de gneis y otras metamórficas), retrabajados

en la línea de costa. El relleno sedimentario inicial, permitió el desarrollo de un ambiente marino litoral, que se mantuvo durante la sedimentación de la unidad, y el desarrollo de la biota fosilífera estudiada.

Correlación: Bermúdez (1966) correlacionó la Formación Abisinia con otras terrazas pleistocenas de la costa venezolana como la Formación Tortuga y las terrazas de Juan Griego y Punta Galera en la Isla de Margarita. También puede correlacionarse con las terrazas pleistocenas del Castillo de Araya, que forman la parte superior de la Formación Cumana.

© **H. Del Castillo, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, enero 1997)

Referencias

Bermúdez, P., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela (Ira. Parte), *Bol. Geol.*, Caracas., 7 (14): 333-411.

Bermúdez, P. y A. Fuenmayor, 1962. Notas sobre los Foraminíferos del Grupo Cabo Blanco, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Boletín Informativo. 5 (1): 3-16.

Gibson-Smith, J., 1971. Cabo Blanco and Boeing-Boeing, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Boletín Informativo. 14 (10): 236-246.

Humboldt, A. Von, 1814-1824. *Rélation historique du voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1794, 1801, 1803 et 1804 par A. Humboldt et A. Bonpland* réigide par A. Humboldt. Traducción al español por Lisandro Alvarado, 1991, "Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente" 2da. Edición, Monte Avila Editores. 5 volumenos.

Weisbord, N. E., 1957. Notes on the Geology of the Cabo Blanco Area, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 38 (165): 1-23.

Weisbord, N. E., 1962. Late Ceneozoic gastrpods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(193): 672.

Weisbord, N. E., 1964-a. Late Cenozoic Pelecypods from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 42(204): 564. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(5): 146.

Weisbord, N. E., 1964-b. Late Cenozoic Scaphodos and Serpulid Polychaetes from northern Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 47(214): 111-203. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(5): 146.

Weisbord, N. E., 1965. Some late Cenozoic Cirripeds from Venezuela and Florida. *Bull. Amer. Paleont.*, 50 (225): 145.

Weisbord, N. E., 1967. Some late Cenozoic Bryozoa from Cabo Blanco Area. *Bull. Amer. Paleont.*, 53 (237): 5-100.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bermúdez, P. y A. Fuenmayor, 1960. Notas sobre los Foraminíferos del Grupo Cabo Blanco, Venezuela. *Ministerio de Energía y Minas*. Informe.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

