


ALGODONES, Miembro (Formación Codore)

VALIDO



NEOGENO (Plioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: R. A. Liddle, 1946, Cuadro de Correlación.

Consideraciones históricas: Liddle (1946, cuadro de correlación) mostró a "Los Algodones" como una unidad concordante sobre la Formación Capadare e infrayacente a la Formación La Vela. Mencher *et al.* (1951, cuadro de correlación) mostraron la Formación Algodones como concordante sobre la Formación Chiguaje y discordante bajo la Formación San Gregorio. Weingeist (LEV I, 1956) publicó la primera descripción de la unidad con el nombre de Formación Algodones, aunque en la descripción de la Formación Codore indica que se emplea también como miembro de esta. Rey (1990) presenta un estudio detallado del Miembro Algodones de la Formación Codore.

Localidad tipo: 4,5 km al este de Río Seco, cerca de la antigua casa de Algodones. Hoja No. 6140, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Weingeist (LEV I, 1956) la describe como consistente de capas lenticulares interestratificadas, de limos, arenas y arcillas amarillas, marrones, rojas, grises y blancas; también se encuentran presentes, formando lentes de poca extensión, algunas areniscas ferruginosas, marrón oscuro, bien consolidadas y conglomeráticas.

Rey (1990) describe el Miembro Algodones como muy similar al Miembro El Jebe, de la misma formación, pero más arenoso. En las secciones occidentales, en el río Urumaco y la quebrada El Paují dominan las areniscas de color ocre a rojizas, de grano fino a medio, masivas o con estratificación cruzada planar y festoneada, laminaciones y raras madrigueras; las limolitas son abigarradas, masivas, con niveles areno-arcillosos, con *Ophiomorpha* en la base del miembro. En el río Mitare, además de la litología anterior, aparecen conglomerados de guijarros polimícticos y la secuencia es prácticamente igual a la del Miembro El Jebe en esta localidad. La sección oriental, en la quebrada Boraure, presenta areniscas y limolitas similares a las secciones occidentales, con la adición de arcillitas masivas en la mitad inferior de la unidad y conglomerados de guijarros muy abundantes hacia el tope de la sección, masivos o con estratificación cruzada, ciclos con gradación normal.

Espesor: Weingeist (LEV I, 1956) cita un espesor de 244 m en su localidad tipo. Rey (1990) midió un espesor máximo en las secciones occidentales de 298 m, mientras que en la sección oriental es de 303 m.

Extensión geográfica: Regiones noroccidental y norcentral de Falcón, desde el río Zazárida al oeste, a las cercanías de Coro, al este.

Contactos: Según Weingeist (LEV I, 1956), el contacto inferior es concordante con el Miembro Chiguaje de la Formación Codore, mientras que el superior de discordancia angular debajo de la Formación San Gregorio. Rey (1990) describe el contacto inferior como concordante sobre el Miembro Chiguaje de la misma formación, colocándose en el tope de la última capa fosilífera de Chiguaje. El contacto superior del Miembro Algodones de la Formación Codore en el área occidental es concordante con la Formación San Gregorio y se coloca en la base del primer conglomerado de peñas típico de esta formación. En el área del río Mitare, no fue posible precisar este contacto, ya que tanto el Miembro Algodones, como la parte inferior de la Formación San Gregorio son de litología similar. En la quebrada Boraure este contacto es concordante con la Formación San Gregorio y se coloca en la base del primer conglomerado de peñas típico de San Gregorio.

Fósiles: El Miembro Algodones de la Formación Codore es estéril. Rey (1990) indica la presencia de *Ophiomorpha* en la base del miembro en la quebrada El Paují.

Edad: Plioceno Tardío, por su posición estratigráfica.

Paleoambientes: Según Rey (1990), la sedimentación del Miembro Algodones fue en una llanura aluvial con canales meandriformes de baja sinuosidad en la región occidental, ríos entrelazados distales en la región central y ríos meandriformes en la región oriental que, en la parte superior de la unidad, pasan a ríos entrelazados distales,

como en la región central. Se considera que el clima fue subhúmedo durante toda la sedimentación de la Formación Codore.

© **Olga Rey, 1997**

(Actualizado por: *María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997*)

Referencias

Liddle, R.A. 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2º Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp* 1, 728 p.

Rey, O. T., 1990. Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, estado Falcón, *Universidad Central de Venezuela, Tesis de M. Sc.*, 162 p., Inédito.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turrnellas; with a list of Venezuelan type stratigraphic localities. *Bull. Am. Paleont.* 11(45): 173-220.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mitspezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113, 369-373.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, *Bol. Inform.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)