

NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1857.

La lutita de Acurigüita es la unidad inferior de la Formación Ricoa de Payne (1951), siendo la unidad más antigua que aflora en el área de Cumarebo. La Formación Ricoa de Payne (1951) consiste esencialmente de arcillas y lutitas, con tres cuerpos de arenas lenticulares, que de más antiguo a más joven son: Turaguapo, Solito y Las Lomas. De acuerdo al concepto de Díaz de Gamero (1985-b), esta formación es parte de la Formación Agua Salada, siendo la lutita de Acurigüita la unidad más antigua del área, que rodea el extremo oriental de la serranía de San Luis. Payne (1951) señala un espesor de unos 667 m (2000 pies) para la unidad, que aumenta a 1300 m (3900 pies) en el pozo Las Pailas 1, el único que la penetra en su totalidad. La edad se considera Mioceno Temprano por su posición estratigráfica sobre la Formación San Luis, ya que no existe ningún estudio paleontológico de la unidad. Se recomienda considerar como inválida esta unidad ya que es parte de la Formación Agua Salada, de la cual no puede ser distinguida.

Véase [RICOA, Formación](#); [AGUA SALADA, Formación](#).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)