




CRETACICO (Aptiense ?)

Estado Portuguesa

Referencias original: A. H. Garner, 1926, p. 679.

Consideraciones históricas: Garner (1926) empleó originalmente el término Caliza de Agua Blanca, para referirse a las calizas que afloran al noroeste de Acarigua, Portuguesa. Debido a correlaciones erróneas con otras unidades calcáreas del occidente de Venezuela, el término se volvió confuso, e inclusive, se propuso eliminarlo (Maync, L.E.V. 1a. ed., 1956). Renz y Short (1960) redefinieron la unidad como Formación Agua Blanca. Bushman (1967) estudió la formación, aportando información adicional.

Localidad tipo: Ladera septentrional del cerro Guacamaya, 2,5 km al norte del pueblo de Agua Blanca, distrito Araure, estado Portuguesa (Hojas 6344 y 6345, Esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Las rocas predominantes en la formación Agua Blanca son calizas laminadas, de color gris oscuro que meteoriza a gris claro, arcillosas y arenosas, las cuales se presentan en capas de gran espesor. Junto con las calizas, se encuentran filitas retorcidas, de color gris oscuro, que meteorizan en tonos gris, rosado, pardo rojizo y gris amarillento, areniscas calcáreas y feldespáticas, gris claro, y asperones con granos de cuarzo oscuro y conglomerados, especialmente hacia la base de la sección.

Espesor: Garner (*op. cit.*) estimó un espesor de 610 m. Renz y Short (*op. cit.*) midieron un espesor total de 750. Bushman (*op. cit.*) sugiere añadir al menos 75 m de una sección basal, no tomada en cuenta por dichos autores.

Extensión geográfica: La unidad aflora a lo largo del flanco sur de la Serranía del Interior, entre Agua Blanca y San Rafael de Onoto, Portuguesa.

Contactos: La Formación Agua Blanca yace discordantemente sobre la Formación Araure. El contacto inferior señalado por Renz y Short (*op. cit.*), fue objetado por Bushman (*op. cit.*), en base a la existencia de capas calcáreas típicas de Agua Blanca, dentro de lo que sería la Formación Araure. En el tope, la unidad pasa concordantemente a la Formación Cojedes, situándose el contacto en la base de los primeros conglomerados de dicha formación.

Fósiles: La Formación Agua Blanca contiene restos de pelecípodos, ostras, espinas de equinoides y corales, pero su recristalización y fragmentación han impedido su identificación.

Edad: Renz y Short (*op. cit.*) sugieren para la formación una probable edad Aptiense.

Correlación: Bushman (*op. cit.*) sugiere una posible correlación de la Formación Agua Blanca, con el Conglomerado de Charallave. También dió como posible equivalente a la Formación Los Cristales, aunque en su cuadro de correlación estratigráfica, correlaciona a Agua Blanca con Formación Río Abajo, actualmente miembro informal de la Formación Nirgua (L.E.V., 1970).

Paleoambiente: La Formación Agua Blanca representa probablemente un ambiente de plataforma de aguas poco profundas, con ocasionales influencias de sedimentos más terrestres.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Bushman, J. R., 1967. Geología de la región entre Agua Blanca y San Carlos. Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 311-336.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p. (Ed. en inglés)

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4, 756 p.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre el Pao y Acarigua, estados Cojedes y Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 1: 277-315.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)