


**TERCIARIO** (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 55-62.

Renz (1948) estableció y describió el Piso Araguatiense como unidad cronoestratigráfica, con sección tipo en la región de Pozón, Distrito Acosta del Estado Falcón; el nombre proviene de la quebrada

Araguata. Sinónimos parciales inválidos son los de Zona A2 de Senn (1935) y Zona de *Cibicides kugleri* de Cushman y Renz (1941).

El piso comprende la zona de *Globorotalia fohsi*, inferior, y la de *Valvulineria berricki*, superior, ambos nombres presentan inconvenientes. La sección tipo del Araguatiense es el cerro Loma Luca en Pozón, con unos 200-208 metros de espesor que corresponden a parte del Miembro de Arcillas Margosas de Husito de la Formación Pozón. En El Mene de Acosta el espesor es de unos 240 metros y en la costa norte de Falcón, cerca de Isidro, de unos 700 metros. Renz definió al piso por la presencia de *Robulus subaculeatus glabratus* y ausencia de *Siphogenerina transversa*; atribuyó la zona inferior al Oligoceno superior, y la superior al Mioceno inferior (Burdigaliense).

Según Blow (1959) las zonas del Araguatiense comprenden un intervalo que se extiende desde mediados de la zona *Globorotalia fohsi fohsi*, a través de la de *G. fohsi lobata* (Zona de "*G. fohsi*" de Renz) e incluye la mayor parte de la zona de *Globorotalia rnayeri* (zona de *V. herricki* de Renz), con una edad correspondiente a parte del Burdigaliense y parte del Vindoboniense. De acuerdo con las determinaciones más recientes a base de faunas planctónicas (Cati *et al.*, 1968), el piso correspondería al Mioceno medio en su totalidad.

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Italiana.*, Boll., 87: 491-503.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1941. New Oligocene-Miocene Foraminífera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

[Enviar Comentarios](#)

1st Ed. English	Comentarios Recibidos



