




CRETACICO TEMPRANO (?)

Estado Portuguesa

Referencia original: O. Renz y K. C. Short, 1960, p. 280.

Consideraciones históricas: El término Formación Araure fue introducido por Renz y Short (1960), para designar las rocas más antiguas que afloran en el núcleo del anticlinorio, en la cuenca al oeste del macizo de El Tinaco. Bushman (1967) usó el mismo término, añadiendo alguna información sobre la litología.

Localidad tipo: Renz y Short (*op. cit.*) señalaron como localidad tipo, la ladera norte del cerro El Loro, a 6 km al norte-noreste del pueblo de Agua Blanca, distrito Araure, estado Portuguesa. Como sección y de referencia dieron la parte norte del cerro Guacamaya, 2,8 km al norte de Agua Blanca (Hojas 6344 y 6345, esc. 1: 100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: En la base de la unidad predominan conglomerados en capas gruesas, alternando con areniscas arcóscas de grano grueso subangular, formados por cuarzo gris oscuro y filitas limosas gris, marrón o verde, las cuales contienen granos y guijarros redondeados de cuarzo, de hasta 2 cm de diámetro. Bushman (*op. cit.*) menciona además, feldespatos y vetas de cuarzo blanco y señala la foliación o esquistosidad con desarrollo de sericita en varios intervalos, así como el cizallamiento y trituramiento de los granos de cuarzo observables en secciones finas.

Espesor: No se conoce el espesor total de la formación. En la localidad tipo están expuestos 700 m.

Extensión geográfica: La formación aflora en el extremo norte del estado Portuguesa, entre Sarare y San Rafael de Onoto.

Contactos: No se conoce el contacto inferior de la formación. En el tope, esta cubierto discordantemente por la Formación Agua Blanca.

Fósiles: No se han encontrado.

Edad: Por su posición estratigráfica, respecto a la Formación Agua Blanca, se supone una edad Cretáceo temprano (Neocomiense-Barremiense ?), para la Formación Araure.

Correlación: En el Léxico Estratigráfico 2a. edición (1970), se insinúa una posible correlación de la unidad con las formaciones Río Negro (occidente) y Barranquín (oriente) y también con las formaciones Las Mercedes y Chuspita de la Cordillera de la Costa. Renz y Short señalan similitud litológica de las areniscas, con el Conglomerado de Charallave.

Paleoambientes: El predominio de clásticos gruesos (conglomerados y arcosas) y la ausencia de sedimentos calcáreos, indican un ambiente continental para la Formación Araure. Renz y Short (*op. cit.*) suponen una invasión marina en la zona de Agua Blanca, en el Cretáceo Temprano, con la deposición de los clásticos continentales de Araure.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Bushman, J. R., 1967. Geología de la región entre Agua Blanca y San Carlos, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas. 8(16): 311-336.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 4, 756 p.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, Estados Cojedes y Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 1: 277-315.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)