

CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Táchira

Referencia original: C. Schubert, 1974

Localidad tipo: Cabecera de los ríos Bobo y el páramo (páramos La Cimarronera y Sumusica), distrito Uribante del estado Táchira, aproximadamente unos 12 km al sur de La Grita y en la parte alta de la quebrada Pedernales, al oeste de Saisayal, en la carretera hacia Pregonero (Hoja No. 5840, escala 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Las Morrenas de Batallón consisten de till, localizado en tres niveles de morrenas bien definidos) 2500-2700 m, 2900-3300 m y por encima de 3400 m). Este till consiste de una mezcla sin escogimiento ni estratificación, cuya granulometría varía entre arcilla y cantos de 1 o más de diámetro. Los cantos y guijarros consisten de gneis granítico y bandeado, cuarcita, esquisto cuarzo micáceo y, ocasionalmente, anfíbolita, litologías que pertenecen al Grupo Iglesias. La acción erosiva glacial, se refleja en las formas orismoidales y tabulares; aproximadamente el 1 ó 2% de los guijarros muestra estrías, y aproximadamente entre el 10 y 20%, están facetados. El till de los niveles inferior y medio está bien consolidado, y muestra evidencias de oxidación en las superficies de los cantos y en la matriz arenosa-limosa; el del nivel superior no está consolidado, y los cantos son frescos.

Espesor: La altura de las morrenas varía entre algunos metros y 100 m o más, lo cual refleja el espesor local de cada cuerpo de till.

Extensión geográfica: Se encuentran en casi todos los valles del páramo El Batallón, tanto en su flanco occidental (ríos Las Palmas y La Grita), como en el oriental (río Uribante), por encima de los 2500 m.

Contactos: El contacto inferior es discordante sobre rocas del basamento (Grupo Iglesias), o sobre sedimentos glaciales o fluvio-glaciales anteriores. El contacto lateral posterior de los arcos morrénicos, es también discordante con el Grupo Iglesias, en la salida de los valles glaciales.

Fósiles: No se han hallado fósiles en el till de las Morrenas de Batallón.

Edad: El till de las Morrenas de Batallón, probablemente representa la sedimentación glacial de los estadios Temprano (nivel inferior) y Tardío (niveles superiores), de la glaciación Mérida (Pleistoceno Tardío).

Correlación: Por analogía litológica, morfológica y en su elevación, las Morrenas de Batallón probablemente son equivalentes al Till de Mucubají, así como a depósitos similares en otros valles andinos (Complejo Morrénico de Piedras Blancas, Morrenas de La Culata). También se ha correlacionado tentativamente con los niveles de till 2, 3 y 4 (Drift 2, 3 y 4) de la Sierra Nevada del Cocuy en Colombia (Van der Hammen *et al.*, 1980-1981).

Paleoambientes: El till de las Morrenas de Batallón fue depositado en forma de morrenas laterales y terminales, cada nivel de morrenas consiste de varios arcos morrénicos, algunas veces superpuestos, lo cual sugiere múltiples avances y retrocesos de los glaciales. Por lo menos doce glaciales de valle y numerosos glaciales colgantes o de circo, existieron en el páramo de El Batallón durante el último máximo glacial (glaciación Mérida) y el clima en la región circundante, debió haber sido periglacial (Schubert, 1974). El nivel glacial descendió aproximadamente 1200 m, con respecto a su posición actual.

Importancia económica: Ninguna

© **Carlos Schubert, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Schubert, C., 1974. Late Pleistocenen Mérida Glaciation, Venezuelan Andes: *Boreas*, 3: 147-152.

Schubert, C., 1982. Geología glacial del Páramo El Batallón, Estado Táchira, Venezuela: *Acta Cient. Venezolana*, 33: 66-71.

Van der Hammen, T., J. Barelds, H. de Jong y A. A. de Veen, 1980-1981. Glacial sequence and environmental history in the Sierra Nevada del Cocuy (Colombia): *Palaeogeog. Palaeoclim. Palaeoecol.*, 32: 247-340.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)