

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Zulia

Referencia original: Young, G.; A. Bellizzia; H. Renz; F. Johnson; R. Robles y J. Mas Vall, 1956, Fig. 41.

Consideraciones históricas: Al descubrirse la presencia de las arenas petrolíferas múltiples de la Formación Misoa en la región del lago de Maracaibo, surgió la necesidad de una nomenclatura uniforme, para explotar ordenadamente estos nuevos yacimientos.

A partir de 1950, la Creole Petroleum Corporation desarrolló una nomenclatura codificada, basada principalmente en las características eléctricas para diferentes intervalos de arenas, según la cual, el intervalo productor se dividía en una formación superior y una inferior, designadas "B" y "C", respectivamente. La Formación "B" fue dividida en miembros o unidades de correlación, numeradas B-1-X a B-9-X en secuencia descendente; asimismo, la Formación "C" fue dividida en las unidades C-1-X hasta C-7-X. Posteriormente, descartó el sufijo "X" en esta terminología.

Otras empresas adoptaron gradualmente el esquema descrito, empleado generalmente en la actualidad. Esta nomenclatura codificada, apareció publicada originalmente, sin descripción, en un registro eléctrico compuesto de los campos costaneros del distrito Bolívar (Young *et al.*, 1956, Fig. 41). Posteriormente, Borger y Lenert (1959) presentaron un diagrama casi idéntico, e incluyeron algunos comentarios breves. Natera (1961) describió detalladamente las unidades B-1-X a B-6-X, y Young (1961), suministró una reseña más detallada del desarrollo y aplicación del esquema, y señaló que las arenas persistentes de los niveles B-6, C-2 y C-4, constituyen los elementos de correlación más fidedignos.

Hasta 1966 se aceptó convencionalmente la equivalencia de las unidades "B" con la Formación Misoa y de las unidades "C" con la Formación Trujillo. En ese año, un comité de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo, revisó la correlación y nomenclatura de los sedimentos paleocenos-eocenos, de la cuenca de Maracaibo, y concluyó que en los campos petrolíferos del lago, sólo se presenta normalmente una unidad litoestratigráfica: la Formación Misoa, suprayacente a las formaciones Guasare-Marcelina, e infrayacente a la Formación Paují. La Formación Trujillo, predominantemente lutítica, constituye una cuña que se adelgaza hacia el suroeste y sólo infrayace a la Formación Misoa en los pozos del extremo norte del lago de Maracaibo, y en la región al este del mismo. Esta importante revisión del concepto previo, se destaca en las monografías de Brondijk (1967-a), y Walton (1967), voceros del mencionado comité.

Véase [MISOA, Formación ; "C" \(o "C-X"\), Miembro.](#)

© *Sin Autor, 1997*

Referencias

Borger, H. D. y E. F. Lenert, 1959. The geology and development of the Bolivar Coastal Field at Maracaibo, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min., y Pet., Bol. Inform.*, 2: 236-256.

Brondijk, J. F., 1967-a. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II: The Misoa and Trujillo Formations. *Asoc. Venez. Geol., Min., y Pet., Bol. Inform.*, 10(1): 3-19.

Natera, B., 1961. Correlation of the uper B-X members in the District of Bolívar, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról., Bol. Inform.*, 4(9): 268-283.

Walton, W. M., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. IV. The informal units of the subsurface Eocene. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról., Bol. Inform.*, 10(1): 21-30.

Young, G.; A. Bellizzia; H. Renz; F. Johnson; R. Robles y J. Mas Vall, 1956. Geología de las Cuencas Sedimentarias de Venezuela y de sus Campos Petrolíferos. *Bol. Geol., Pub. Esp.*, 2, Caracas, 140 p.

Young, G. A., 1961. Problems of Eocene correlation in lake Maracaibo, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Pet.*, Bol. Inform., 4(8): 231-255.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologic formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

González de Juana, C., 1951-c. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: Las formaciones del Eoceno en Los Andes venezolanos y en la subcuenca del lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 265-287.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 71-112.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(46): 171-220.

Kuyl, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Liddle, R A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Liddle, R A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson J. M. y R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Miller, J. B. y CH. Collinson, 1951. A new species of *Hercoglossa* from Maracaibo. *Jour. Paleont.*, 25(3): 377-379.

Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. Caracas, *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 6(3): 63-97.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Rubio, F. E., 1960. Condiciones de las acumulaciones de petróleo en los campos costaneros del distrito Bolívar, lago de Maracaibo. *Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 3: 1009-1024.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(2): 215-227.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela *Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.*, 30(10): 1621-1741.

Tash, G. E., 1937-a. Estratigrafía y paleontología de Mene Grande y sus cercanías. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 167-180.

Tash, G. E., 1937-b. Stratigraphy and paleontology of Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 157-172.

Van Raadshoven, B., 1951. On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela, *IIIrd. World Petrol. Congr., Proc., La Haya*, 1951, Sec. I, p. 476-489.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 3(3): 49-61.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)