

TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Trinidad

Referencia original: J. A. Cushman y H. H. Renz, 1947, p. 3.

La Zona de *Globigerina dissimilis* fue mencionada originalmente en la Formación Ste. Croix de Trinidad (Cushman y Renz, 1947) y vino a ser aceptada como el intervalo entre los niveles de extinción de *Globigerina ciperoensis* y la aparición inferior extrema de *Globigerinatella insueta*. Stainforth (1960-a, b) utilizó el término con este criterio en un intento de correlación transatlántica a base de zonas de foraminíferos planctónicos. Barnola (1960) y Lamb y De Sisto (1963) la mencionan en la Formación Carapita de Venezuela oriental (con el nombre modificado de Zona de *Catapsydrax dissimilis*). Stainforth (1961) sugirió el empleo de la base de esta zona como límite Oligoceno/Mioceno en Venezuela.

Bolli (1957) definió una zonación planctónica más precisa en Trinidad: la zona original fue subdividida en una parte superior, con la misma especie índice, y una parte inferior, designada Zona de *Globorotalia kugleri*. La Zona de *Catapsydrax dissimilis*, en el sentido restringido de Bolli, ha sido mencionada por Lamb (1964-a, b) en Venezuela oriental, y por Blow (1959) en Venezuela occidental.

En la literatura previa el intervalo correspondiente a la Zona de *Catapsydrax dissimilis* se asignaba al Oligoceno medio (Cushman y Renz, 1947; Stainforth, 1948). Sin embargo, estudios posteriores indican una edad Mioceno Temprano (Aquitaniense) aceptada hoy en general (Blow, 1959; Bolli, 1959; Stainforth, 1960-a, b, 1961).

El nombre genérico de la especie índice aparece diversamente como *Globigerina*, *Catapsydrax* o *Globigerinita*.

Referencias

Barnola, A., 1960. Historia del Campo de Pedernales. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 552-573.

Blow, 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1957-a. The genera Praeglobotruncana, Rotalipora, Globotruncana and Abathomphalus in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 51-60.

Bolli, H. M., 1957-b. The genera Globigerina and Globorotalia in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 155-172.

Bolli, H. M., 1959. Planktonic Foraminifera from the Cretaceous of Trinidad, *B.W.I., Bull. Am. Paleontol.*, 39: 257-277.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1947. The foraminiferal fauna of the Oligocene Ste. Croix Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res.*, Sp. Publ. 22, 46 pp.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphoguerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.

Lamb, J. L. y J. De Sisto, 1963. the Morichito Formation of northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(9): 269-276.

Stainforth, R. M., 1948-a. Description correlation and paleoecology of Tertiary Cipero Marl Formation, Trinidad, *B.W.I. Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(7): 1292-1330.

Stainforth, R. M., 1948-b. Applied micropaleontology in coastal Ecuador. *Jour. Paleont.*, 22(2): 113-151.

Stainforth, R. M., 1960-a. Estado Actual de las Correlaciones Trasatlánticas del Oligo-Mioceno por medio de Foraminíferos Plántonicos. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., I : 382-406.

Stainforth, R. M., 1960-b. Current status of trasatlantic Oligo-Miocene correlation by means of plancktonic foraminifera. *Micropaleontology*, 2(4): 219-230.

Stainforth, R. M., 1961. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 256-258.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)