




TERCIARIO (Plioceno) - CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Miranda

Referencia original: V. M. Seiders, 1965, p. 3

Consideraciones históricas: Seiders (1965), designa el término informal de Capas de Cauagua para designar sedimentos concordantes suprayacentes a la Formación Cumaca en la cuenca

inferior del río Tuy, estado Miranda, los cuales describe como gravas, lodos compactados y cantidades menores de arenisca, de unos 700 m de espesor. Posteriormente, González de Juana *et al.* (1980), la elevaron al rango de formación.

Localidad tipo: La Formación Cauagua aflora a lo largo de los valles del bajo Tuy. González de Juana *et al.* (*op. cit.*) designan la localidad tipo en los cortes de carretera Cauagua-Tapipa al este de Cauagua, distrito Acevedo del estado Miranda (Hoja 6947, 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Patrick y Urbani (inéditos en González de Juana *et al.*, *op. cit.*), describieron a la Formación Cauagua, como una secuencia de conglomerados y arcillas de color pardo rojizo, caracterizadas por: 1) un 50% de lutitas de color canela a marrón amarillento, gris a rojo, pobremente estratificadas en capa delgadas a masivas, limosas a arenáceas, con guijarros diseminados de cuarzo y fragmentos de rocas metamórficas, y algunas capas ligeramente carbonáceas; 2) 5% de areniscas rojo oscuro a marrón, marrón amarillento a marrón oscuro, en capas delgada a masivas, irregulares, friables a ligeramente endurecidas, arcillosa a conglomeráticas, a veces carbonáceas; 3) 25% de conglomerado rojo oscuro a marrón amarillento, con estratificación delgada a masiva lenticular, friable a levemente endurecida, con cantos de cuarzo y rocas metamórficas, en una matriz arcillosa; gradan frecuentemente a arenas.

Espesor: Seiders (*op. cit.*) midió un espesor de 700 m, sin observar el contacto superior.

Extensión geográfica: Aflora en los valles del bajo Tuy, entre Araguaita y Curiepe, en el flanco sur de la Cordillera de la Costa. Los mejores afloramientos se observan en los cortes de la carretera Cauagua-Tapipa.

Contactos: La Formación Cauagua suprayace discordantemente a la Formación Aramina (Mio-Plioceno), e infrayace con discordancia a la Formación Mamporal (Pleistoceno ?) (González de Juana *et al.*, *op. cit.*). Localmente, al oeste de la cuenca, la Formación Cauagua se encuentra discordante sobre rocas metamórficas.

Fósiles: Wolcott (inédito en González de Juana *et al.* *op. cit.*), describió macrofósiles no diagnósticos, cerca de la base de la formación, en el río Urape.

Edad: La edad de la Formación Cauagua se basa en su posición estratigráfica discordante sobre la Formación Aramina del Mio-Plioceno, y por debajo de sedimentos poco consolidados de la Formación Mamporal atribuida al Pleistoceno Tardío (González de Juana *et al.*, *op. cit.*). Por su posición estratigráfica, se considera que la edad de la Formación Cauagua, es Plioceno-Pleistoceno.

Correlación: La Formación Cauagua ha sido correlacionada con la Formación Guatire (Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2a Ed., 1970).

Paleoambientes: González de Juana, *et al.* (*op. cit.*) sugieren un ambiente sedimentario de abanico aluvial, bajo un clima árido y subárido.

© José Méndez Baamonde, 1997

Referencias

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 146-147.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)