

TERCIARIO TARDIO

Estado Miranda

Referencia original: V. M. Seiders, 1965, p. 393.

Este término fue propuesto informalmente por Seiders (1965) para designar sedimentos concordantes suprayacentes a la Formación Cumaca en la cuenca inferior del río Tuy, Estado Miranda, los cuales describe como gravas, lodos compactados y cantidades menores de arenisca, de unos 700 metros de espesor. Según el mismo autor, la unidad corresponde a la Formación Guatire en la misma región, descrita por Dusenbury (1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela), y restringida por Bermúdez (1966) a la cuenca de Guarenas-Guatire, donde la reemplaza la Formación Aramina. Bermúdez (1966) considera las Capas de Caucagua como equivalente conglomerático de la Formación Mamporal.

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Primera Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 1, p. 728.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)