


CAUDERALITO, Miembro (Formación Agua Clara)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 263-264.

Liddle (1928) mencionó este miembro como sección de la Formación Agua Clara, expuesta en el río "Cauredalito" (ortografía errónea por Cauderalito). Dicha sección tiene unos 450 m de espesor y consiste de calizas margosas, lutitas arenosas calcáreas, lutitas, arenas y areniscas. Wheeler (1960) establece la subdivisión de la Formación Agua Clara en la región noroccidental del distrito Democracia y nororiental del distrito Buchivacoa (Falcón occidental), en dos miembros: Cauderalito, inferior, y Santiago, superior. Se caracteriza por calizas arrecifales, muy fosilíferas, las cuales contienen corales, briozoarios, pelecípodos, gasterópodos y foraminíferos grandes. Las calizas se engrosan y se adelgazan rápidamente, variando de calizas cristalinas, masivas, azul-gris a calizas arcillosas amarillo-marrón, con intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas. Las lutitas y limolitas son compactas, gris claro a oscuro, carbonáceas y jarosíticas, con vetas de carbón. Las areniscas son de grano fino, grises, meteorizando a color de ante, carbonáceas y micáceas.

Se encuentra bien expuesto en la quebrada Cauderalito, al norte de cerro Frío, en la parte central del distrito Buchivacoa y las calizas son especialmente prominentes en esta región.

Desde aquí hacia el este y el oeste se hacen menos abundantes. El miembro es concordante en su base con la Formación Castillo, colocándose el contacto en el tope de la última arenisca masiva de grano grueso, por encima de la cual se encuentra la interestratificación de calizas, areniscas, limolitas y lutitas. El contacto superior, también concordante, es con el Miembro Santiago, lutítico, de la Formación Agua Clara.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Liddle, R.A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J.P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, I: 407-465.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Koch, R., 1926. *Miogypsina Staufferi*, N. sp., from northwestern Venezuela. *Eclog. Geol. Helv.*, 19(3): 751-753.

Williston, S. H. y Nichols, C. R., 1928. The geology of Venezuela and Trinidad, by R. A. Liddle. Review. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4): 445-451.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

Liddle, R.A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. 2da. ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N.Y., 890p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene Stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)