




PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: V. Mendoza, 1974, p. 313.

Consideraciones históricas: Mendoza (1974) introdujo el nombre de Supergrupo Cedeño para definir una unidad litoestratigráfica volcánico-plutónica ácida que incluye los grupos Cuchivero y

Suapure, los cuales están separados entre sí por metabasitas. El Supergrupo se extiende en dirección, E-O desde las inmediaciones del río Caura hasta Puerto Páez y en dirección N-S desde el río Orinoco hasta el río Ventuari, es decir, aflora en casi todo el distrito Cedeño, estado Bolívar y parte norte-central del estado Amazonas, de acuerdo al autor puede alcanzar una extensión mayor de 1.000.000 km². La mejor sección tipo (NE-SO) se localiza en las proximidades del río Suapure, entre la serranía de Guacharacaima y Los Pijiguaos (Hoja ????????, esc: ???????, Cartografía Nacional).

Allí afloran las siguientes unidades: Granito de San Pedro, Metabasitas, Granito de Pijiguo y Granito rapakivi de El Parguaza. No aflora en esta área el Granito de Gramiamito. No se conoce la base del supergrupo, su tope es discordante por debajo del Grupo Roraima. Regionalmente el Supergrupo Cedeño puede asumirse como comprendida entre 1750 ± 50 m.a. y 2200 ± 200 m.a. En tiempo y en litología es correlativo de las metavolcánicas ácidas y los Granitos biotítico y rapakivi hornabléndico de wilhemina Mountains de Surinam. En tiempo, pero no en litología, es correlativo en parte con el Grupo Botamano.

Véase [CUCHIVERO, Serie Ignea](#); [CUCHIVERO, Asociación Ignea](#); [CUCHIVERO, Grupo](#); [SUAPURE, Grupo](#); [CAICARA, Formación](#); [SANTA ROSALIA, Granito de](#); [GUANIAMITO, Granito de](#); [PIJIGUAO, Granito de](#); [PARGUAZA, Granito del](#).

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Mendoza, 1974. ??????????????????????

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)