




PALEOGENO (Eoceno Tardío?)

Estado Falcón

Referencia original: C. Wiedenmayer, 1924, p. 511.

El nombre y descripción original de la unidad aparecen en Wiedenmayer (1924), para designar una secuencia de calizas lenticulares expuestas en cerro Campana, a unos 7 km al nortenoeste de El Mene de Acosta, en Falcón oriental. De acuerdo a Renz (LEV I, 1956), la caliza de Cerro Campana es una caliza arrecifal de algas y orbitoides, con numerosos ejemplares de *Lepidocyclina*. Gorter y Van der Vlerk (1932) y Gravell (1933) describieron la fauna de foraminíferos grandes de estas calizas, asignadas al Eoceno Tardío por Senn (1935).

La caliza de Cerro Campana no ha sido estudiada desde los trabajos anteriores, ya que Hunter (1972) y Díaz de Gamero (1985b) solo aportan datos de los sedimentos eocenos (que no incluyen calizas) aflorantes en el domo de Guacharaca, al oeste del domo de Cerro Campana.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Cong. Geol. Venez., Mem.*, 1: 454-502.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol., Pub. Espec.* N° 1, 664 p.

Gorter, N. E. y I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.*, 4(2): 94-122.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela, *Smithsonian Misc. Coll.*, 89(11): 44.

Hunter, V. F., 1972. A middle Eocene flysch from east Falcón, Venezuela, *VI Conf. Geol. del Caribe*, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 126-130.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am., Mem.* 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.

Wheeler, 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeasrern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)