




TERCIARIO (Plioceno)

Referencia original: M. Vignali C., 1965, p. 29.

Este término designa el miembro superior de la Formación Cubagua descrita por Vignali (1965), con localidad tipo en el cerro Negro, parte occidental de la península de Araya, en la serranía al norte del valle de la Sabana, unos 2 kilómetros al norte de Manicuare, Distrito Sucre del Estado Sucre. Vignali (1965) describe una marga arenosa basal de 2 metros de espesor, color crema, fosilífera con *Ostrea haitensis* y *O. crassissima*, seguida por intercalaciones de areniscas limosas delgadas poco coherentes y margas fosilíferas, que gradan a calizas margosas al ascender en la sección. El miembro tiene 22 metros de espesor; es concordante y transicional en su base con el Miembro Cerro Verde, y aparentemente concordante en su tope, aunque con un hiato demostrado por la paleontología, con la Formación Cumaná. Faunalmente corresponde a parte de la zona de *Globorotalia rnargaritae* y la zona de *Globoquadrina altispira altispira*-*Globorotalia crassaformis* (Bolli y Bermúdez, 1965; Bermúdez, 1966) cuya edad se considera actualmente como Plioceno. Vignali (1965) correlacionó el miembro con la Formación Springvale de Trinidad y con unidades del Terciario Superior en el Estado Falcón.

Véase [CUBAGUA, Formación](#).

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Vignali, C. M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. *GEOS*, Univ. Cent. Venez., Caracas, (13): 23-36.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)