


CERRO VERDE, Miembro (Formación Cubagua)

VALIDO



TERCIARIO (Mioceno Tardío - Plioceno)

Estado Sucre

Referencia original: M. Vignali, 1965, p. 29.

Consideraciones históricas: Este término fue propuesto por Vignali (1965), para designar el miembro inferior de la Formación Cubagua, aflorante en el extremo oeste de la península de Araya. Consiste en paquetes métricos de conglomerados tipo pudinga, de rocas metamórficas con matriz arenosa, intercaladas con arcilitas arenosas, de color gris y pardo, que pasan verticalmente a limolitas y areniscas calcáreas y fosilíferas, con 45 m de espesor en su sección tipo. Suprayace discordantemente en rocas metamórficas de la Formación Manicuaire, e infrayace transicionalmente al Miembro Cerro Negro. Bermúdez (1966) empleó el término al subsuelo de la isla Cubagua, a base de criterios bioestratigráficos. Macsotay (1965) enumeró abundantes moluscos de la sección tipo, que sugieren un paleoambiente marino costanero de aguas someras. Bolli y Bermúdez (1965) describen una microfauna correspondiente a la zona de *Neoglobogadrina dutertrei*, del Mioceno superior. La fauna de moluscos corresponden a las zonas de *Turritella caronensis* (parte) y *T. lloydsmithi*, de edad igualmente Mioceno superior (Macsotay, 1971; Macsotay y Campos Villaroel, 1987).

Véase [CUBAGUA, Formación](#).

© O. Macsotay, 1997

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Macsotay, O., 1965. Carta faunal de macrofósiles correspondientes a las formaciones cenozoicas de la Península de Araya, Estado Sucre. *GEOS*, Univ. Cent. Venez. 13: 37-49.

Macsotay, O., 1971. Zonación del Post-Eoceno de la Paleoprovincia Caribe-Antillana a base de Taxa de *Turritella* (Molusco: Gasterópodo). *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról.*, 14(2): 18-62.

Macsotay, O. y V. Campos, 1987. ?????????????????????????????????????

Vignali, C. M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. *GEOS*, Univ. Cent. Venez., Caracas, (13): 23-36.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bermúdez, P. J. y Fuenmayor, A. N., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Segunda parte. Los foraminíferos bentónicos. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 413-611.

Bolli, H. M., 1964. Observations on the stratigraphic distribution of the some warm-water planktonic foraminifera in the Young Miocene to Recent. *Eclog. Geol. Helv.*, 57(2): 541-552. Resumen (1965) en: *Asoc. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(11): 325.

Dalton, L. V., 1912-a. *Venezuela, The South American series*, T. Fisher Unwin, London, 320 p.

Dalton, L. V., 1912-b. On the geology of Venezuela. *Geol. Mag.* (London), 9(575): 203-210.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 58(8): 689-702

Kugler, H. G., 1957. Contribution to the geology of the islands Margarita and Cubagua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.* 68(5): 555-566.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 1: 1-728.

Senn A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-161.

Van Der Bold, W., 1964. Notas sobre los ostrácodos de la Formación Punta Gavilán. *Bol. Geol. Caracas*, 12(22): 333

Young, G.; A. Bellizzia; H. Renz; F. Johnson; R. Robles y J. Mas Vall, 1956. Geología de las Cuencas Sedimentarias de Venezuela y de sus Campos Petrolíferos. *Bol. Geol.*, Pub. Esp., 2, Caracas, 140 p.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)