

MESOZOICO ?

Estado Miranda

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p. 7.

Consideraciones históricas: Aguerrevere y Zuloaga (1937) introdujeron este nombre para designar un metaconglomerado de guijarros de cuarzo ahumado, cementado por cuarcita blanca de grano fino, expuesto al norte de Charallave, estado Miranda, que situaron en la base de su "Serie de Villa de Cura". Autores posteriores emplearon terminologías diferentes para designar la unidad, considerada como miembro superior de la Formación Las Mercedes (Smith, 1952), infrayacente al Miembro Los Naranjos de la Formación Tucutunemo (MacLachlan *et al.*, 1960), como unidad intermedia entre las formaciones Las Mercedes y Las Brisas (Konigsmark, 1965). Seiders (1965) empleo nuevamente el nombre de Conglomerado de Charallave, que excluyó de La Formación Las Mercedes y consideró como parte de sus "Rocas de Conoropa". Menéndez (1965) consideró la unidad como un conjunto de bloques alóctonos, suprayacente al Miembro Los Naranjos de la Formación Tucutunemo. Beck (1985, p. 195, 203; 1986) ubica esta unidad en su "[Napa de Caucagua - El Tinaco](#)", considerándola ubicada por encima a su Esquisto de la quebrada Curucujul, y discordantemente por debajo de la Formación Tucutunemo.

Localidad tipo: Smith (1952) señala como localidad tipo a "la vecindad de la población de Charallave", en su [mapa](#) aparece el símbolo de conglomerado correspondiente a esta unidad, a 3 km al norte de Charallave en la antigua carretera Caracas - Charallave, así como en dos cuerpos mayores al suroeste de Charallave, estado Miranda. Hoja 6846, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La litología más distintiva es el metaconglomerado esquistoso con guijarros de cuarzo ahumado, cementados por una cuarcita blanca, donde los guijarros de cuarzo varían de algunos milímetros a cerca de un centímetro. En el sector La Magdalena - Sabaneta, Beck (1985, p. 195, 1986) encuentra que la unidad esta constituida por una serie de esquisto muy alterado, intercalado con niveles delgados de filita cuarcífera con micas blancas, niveles de cuarcita y capas o lentes de uno a varios metros de espesor de metaconglomerado. En algunos niveles del metaconglomerado, se nota una clara variación granulométrica. Los clastos redondeados presentan cuarzo con bordes muy suturados, así como clastos de cuarcita de grano fino y estructuras miloníticas. El cemento se encuentra en pequeña proporción y está compuesto de cuarzo microcristalino suturado y una proporción variable de mica blanca, minerales opacos y clorita.

En un afloramiento a 1,5 km al oeste de Sabaneta cerca del río Tuy, ésta unidad esta en contacto de falla con las rocas de la "Napa de Loma de Hierro", allí, Beck (1985, p. 197, 1986) encuentra un conglomerado diferente al de otras localidades conteniendo elementos de: una roca ígnea cataclástica con cuarzo y plagioclasa, esquisto con esfena y epidoto, cuarcita con mica blanca; mientras que en el cemento, a través de análisis petrográfico y con microsonda de electrones, se determinó la presencia de almandino, lawsonita, paragonita y fengita. En términos generales la unidad se compone de una asociación de esquisto intercalado con cuarcita y metaconglomerado con guijarros de cuarzo ahumado.

Espesor: No se ha señalado.

Extensión geográfica: Los dos mayores cuerpos cartografiados por Smith (1952) son de aproximadamente 1 km² cada uno y se encuentran a 5,1 km y 6,5 km, respectivamente, al suroeste de Charallave. Beck (1985, 1986) señala otros cuerpos cerca de Sabaneta, quebrada Cúa, mientras que Seiders (1965) lo reporta al este de Santa Lucía, hasta cerca de Caucagua, estado Miranda.

Expresión topográfica: Es difícil ver los afloramientos de esta unidad, ya que en la mayoría de las veces aparece como grandes bloques plurimétricos de metaconglomerado en laderas y fondos de quebradas.

Contactos: Según Beck (1985, p. 202, 1986) la unidad yace discordantemente por debajo de la Formación Tucutunemo, y por encima del Esquisto de la quebrada Curucujul, a través de un contacto de naturaleza no definida, pero que interpreta como normal y transicional.

Fósiles: No se han reportado.

Edad: Ha sido interpretado como de edad Triásico - Jurásico o pre-Mesozoico por Beck (1985, p. 204, 1986).

Sinonimia: Charallave, Formación, Miembro, Miembro conglomerático de, Miembro de conglomerado de.

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Konigsmark, T. A., 1965 Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 3, 2: 676-684. Versión en inglés: Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.

Menéndez V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Smith, R. J. 1952. Geología de la región de Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6) : 333-406.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formation of the central part of the Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260 (ed. en inglés).

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to Recent sedimentary environments in Trinidad. Vereinig. Schweiz. Petr. Geol. und Ing. (*Assoc. Suisse des Geol. et Ing. du Petrol.*), Bull., 20(59): 27-60.

Nicklas, M., 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 13(36): 369-376.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of the Coast Range of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 27(10): 1632.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)