


CHIGUAJE, Miembro (Formación Codore)

VALIDO



NEOGENO (Plioceno Temprano a Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: C. González de Juana, 1937, p. 202.

Consideraciones históricas: González de Juana (1937) mencionó el "paquete marino" de Chiguaje en la parte superior de la Formación La Vela. Weingeist (LEV I, 1956) describió la unidad con rango de formación, aunque en la descripción de la Formación Codore, indica que se emplea también como miembro de esta, con localidad tipo cerca del río Urumaco o Codore. Vallenilla (1961) utiliza el nombre de Miembro Chiguaje para la sección marina, superior, de la Formación La Vela. Hunter (1976) estudia la fauna de foraminíferos de Chiguaje en su área tipo. Rey (1990) estudia detalladamente la unidad. Hambalek *et al.* (1994) presentan un estudio palinológico del Miembro Chiguaje. Rey (1990, 1994) propone restringir el nombre de Miembro Chiguaje a la Formación Codore e invalidar este término en la Formación La Vela.

Localidad tipo: La localidad tipo del Miembro Chiguaje de la Formación Codore se encuentra en el cerro Chiguaje, a poca distancia al este del río Urumaco o Codore, al norte de la población de Urumaco, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja N° 6149, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Según Rey (1990), el Miembro Chiguaje está compuesto esencialmente por arcillitas y limolitas calcáreas y fosilíferas, con algunas coquinas. En las secciones centrales (quebrada El Paují y río Mitare) hay también areniscas calcáreas de grano fino a medio, masivas o con estratificación cruzada, ocasionalmente con madrigueras. Las coquinas son más espesas (hasta 2 m) y frecuentes en la sección de la quebrada Boraure, la más oriental.

Espesor: El espesor máximo del Miembro Chiguaje se midió en el río Urumaco, de 72 m (Rey, 1990).

Extensión geográfica: El Miembro Chiguaje tiene la misma extensión que la Formación Codore, desde el río Zazárida, al oeste, a la quebrada Boraure, al este (Rey, 1990).

Contactos: De acuerdo a Rey (1990), el contacto inferior del Miembro Chiguaje es concordante con el Miembro El Jebe, ambos de la Formación Codore, y se coloca en la base de la primera arcillita fosilífera (río Urumaco), en la base de la primera arenisca fosilífera (quebrada El Paují y río Mitare) o en la base de la primera limolita fosilífera (quebrada Boraure) del Miembro Chiguaje.

El contacto superior no se observó en las secciones más occidentales, pero se asume concordante. En el río Mitare es concordante y se coloca en el tope de la última arenisca fosilífera, mientras que en la quebrada Boraure se hace en el tope de la última arcillita fosilífera del Miembro Chiguaje.

Fósiles: De acuerdo con Hunter (1976), las faunas del Miembro Chiguaje están dominadas por los géneros *Ammonia* y *Buliminella*. Rey (1990) estudia los conjuntos de foraminíferos encontrando, que son poco diversos, dominados por bénticos, en las secciones occidentales. La sección del río Mitare es fosilífera solo en su base, de donde se recobró una asociación regularmente diversa, con elementos planctónicos determinantes de edad (*Globorotalia margaritae* y *Globorotalia* cf. *miocenica*) y algunas microfaunas retrabajadas. En la quebrada Boraure, al este, la sección es fosilífera en su totalidad, con asociaciones de diversidad moderada, dentro de las que se encontraron *Globorotalia plesiotumida* y *Globigerina rubescens*. Rey (1990) reporta también la macrofauna de moluscos del miembro. Hambalek *et al.* (1994) estudian la palinología del miembro intermedio, encontrando palinomorfos marinos, además de polen y palinomorfos de agua dulce transportados.

Edad: Rey (1990) interpreta una edad Plioceno Temprano a Tardío (zonas de *Globorotalia margaritae* y *Globorotalia miocenica*) para el Miembro Chiguaje, de acuerdo a la presencia de foraminíferos planctónicos indicativos de esa edad. Hambalek *et al.* (1994) indican una edad Mioceno Tardío a Plioceno para el Miembro Chiguaje, en base a palinomorfos indicativos de la parte superior de la Zona de *Echitricolporites spinosus*.

Correlación: El Miembro Chiguaje representa un evento marino de carácter regional que puede ser correlacionado con un nivel rico en foraminíferos planctónicos en la Formación La Vela, situado en la parte superior de la unidad

(Rey, 1990).

Paleoambientes: De acuerdo a Rey (1990), la sedimentación del Miembro Chiguaje representa una corta invasión marina muy somera sobre la llanura aluvial previa. La línea de costa fue irregular, con la presencia de bahías en las regiones occidental y oriental, mientras que en la región central se desarrollaron pequeñas barras, con representación de facies de barrera y de laguna costera. La invasión marina de Chiguaje no llega a las cercanías de Coro, se reconoce solo hasta la quebrada Boraure. Hambalek *et al.* (1994) consideran que el Miembro Chiguaje se sedimentó en ambientes marinos de poca profundidad de la zona submareal, intramareal inferior a plataforma somera, cerca de la línea de costa.

© **O. Rey, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

González de Juana, C., 1937. Geología y estratigrafía de la región de Cumarebo, estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 197-217.

Hambalek, N., Rull, V., De Digiacomio, E. y Díaz de Gamero, M. L., 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neógeno en el Surco de Urumaco, estado Falcón. Estudio palinológico y litológico, *Bol., Soc. Venez. de Geól.*, 19(1-2): 7-19.

Hunter, V. F., 1976. Benthonic microfaunal shelfal assemblages and Neogene depositional patterns from northern Venezuela, *I Intern. Symp. Benthonic Foram. Cont. Marg.*, B: 459-466.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson, and R. H. Robie, 1951 Geological review, chapter I, p. 1-75, in Terct of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Offiee of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela , *Bol. Geol.* (Venezuela), Publ. Esp., 1: 1-728.

Rey, O. T., 1990, Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, estado Falcón, *Universidad Central de Venezuela, Tesis de M. Sc.*, 162 p. Inédito.

Rey, O. T., 1994, Miembro Chiguaje: Formación La Vela o Formación Codore, *Soc. Venez. Geol., Bol.*, vol. 19, Nos. 1-2, p. 50-53.

Vallenilla, P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, estado Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inf., 4(12): 19-78.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)