


**CRETACICO (Aptiense)**

Estado Sucre

Referencia original: J. E. Smith, 1951, Fig. 4.

Este nombre fue utilizado sin definición por Smith (1951, Fig. 4); posteriormente la Zona de *Choffatella* fue propuesta y descrita formalmente por Maync (en Rod y Maync, 1954) quien la muestra como restringida en Venezuela al Aptiense, a pesar de que en la misma ilustración indica la extensión de la especie *Choffatella decipiens* Schlumberger hasta el Albiense Temprano.

Choffatella decipiens parece ser un excelente fósil índice en Venezuela. En la Serranía del Interior en los estados Sucre, Anzoátegui y Monagas se reconoce en las partes superior de la Formación Barranquín e inferior de la Formación El Cantil (Formación Borracha de Rod y Maync). Se ha identificado en rocas metamórficas de la península de Paria (Formación Güinimita) (González de Juana *et al.*, 1965) En el occidente del país, se reconoce en la parte inferior de la Formación Apón.

Referencias

González de Juana, C.; H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.

Rod, E. y W. Maync, 1954. Revisión of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38(2): 193-283.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo district, Venezuela, *3rd. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I, p. 66-71.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, E. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, E. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 28(1): 1-28.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1963. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Vereinig. *Schweiz. Petr.-Geol. und -Ing.*, Bull., 20(59), Basel: 27-60.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Maync, W., 1949-50. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean Region (Venezuela, Cuba, Mexico, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n. sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 4(3): 101-103.

Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Von der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (estado Sucre), *Boll de Geol.* (Venezuela), 3(8): 123-211.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge, and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)