


**CRETACICO (Albiense Tardío)**

Serranía del Interior, Venezuela nororiental

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954.

El término fue definido originalmente por Rod y Maync (1954), para referirse a la parte superior, arenosa-margosa-glaucónica de su Formación Chimana, y fue invalidado posteriormente, por haber sido definido en base a criterios cronoestratigráficos más que litoestratigráficos (Rosales, 1959, 1960; Salvador, 1964-b; Soc. Venez. Ing. Petról., 1963; CVET, 1970). Yoris (1985, 1988) propone el rescate del término, por cuanto la Formación Chimana posee variaciones laterales y verticales de facies reconocibles y útiles, para definir los cambios de sedimentación ocurridos durante el Albiense, en la Serranía del Interior. El Miembro Corral Viejo es definido por este autor, como la litología con predominio de lutitas blandas oscuras, calcáreas y con intercalaciones de margas glauconíticas y calizas negras laminadas; lateralmente, presenta desarrollos de areniscas micáceas glauconíticas. La definición de Yoris (1985, 1988) restringe el término de Rod y Maync (1954), a la parte superior de la Formación Chimana, el cual suprayace al Miembro Caripe en la región del mismo nombre, en el estado Monagas; la sección tipo de Rod y Maync (*op. cit.*) se propone mantenerla (Corral viejo al suroeste de Caripe), separando la litología perteneciente al Miembro Caripe; una sección más de referencia ha sido propuesta por Yoris (1988), en el franco noroeste del anticlinal de cerro Grande, al sureste Guanaguana, estado Monagas. El Miembro Corral Viejo pasa lateralmente al oeste al Miembro Caripito (región de Caripito-Azagua, estado Monagas), y al noreste es equivalente, en parte, a las facies del Miembro Putucual, en la región al este de Casanay (estado Sucre). Hacia el norte de la serranía, al noreste de Cumanacoa (estado Sucre), han sido reconocidas secuencias adjudicadas a la Formación Chimana, que corresponden a la litología del Miembro Corral Viejo (Yoris, 1988). Su edad se adjudica al Albiense tardío, en base a su posición estratigráfica sobre el Miembro Caripe y a la edad paleontológica (Albiense) de la Formación Chimana, de Guillaume *et al.* (1972), la cual corresponde a los miembros Caripe y Corral Viejo, en la región de Caripe.

Véase [CHIMANA, Formación](#).

© **Franklin G. Yoris V., 1997**

Referencias

- Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4: 756 p.
- Guillaume, H. A.; H. M. Bolli, y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretáceo inferior en la Serranía del Interior, oriente de Venezuela. *Bol. Geol., Pub. Esp.* 5(3): 1619-1659.
- Rod, E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol., Bull.* 38(2): 193 - 283.
- Rosales, H., 1959. Discusión sobre la Formación El Cantil del noreste de Venezuela. *Bol. Geol., Caracas*, 5(10): 99-105.
- Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior Venezuela nororiental. *Bol. Geol., Caracas, Pub. Esp.* 2(3): 471-495.
- Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the Stratigraphic Nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol. Bol. Inf.* 7(6): 153-202.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria Petrolera en Venezuela. Cong. Ven. Geol. Min. Petrol. I, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. : 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol., Bol. Inf.*, 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Yoris, F. G., 1985a. Revisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; J. H. Ríos y N. P. Bellizzia, de (Eds.) *VI Cong. Geol. Ven.*, Caracas. 2: 1343-1393.

Yoris, F. G., 1985b. Análisis petrográfico-estadístico de areniscas del Grupo Sucre (franja oeste del Río San Juan; estados Sucre y Monagas), Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; J. H. Ríos y N. P. Bellizzia, (Eds.): *VI Cong. Geol. Ven.*, Memoria 2: 1307-1342.

Yoris, F. G., 1988. Localidades tipo para los miembros de la Formación Chimana en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geol.*

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol., Bull.*: 28(1): 1-28.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Maync, W., 1955a. Dictyoconus walnutensis (Carsey) in the Middle Albian Guácharo limestone of eastern Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res.*, Contrib., 6: 85-93, pt 3.

Maync, W., 1955b. *Coskinolina sunnilandensis*, n. sp., a Lower Cretaceous (Urgo-Albian) species, *Cushman Found. Foram. Res.*, Contrib., 6: 105-111, pt. 3.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.* 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)