



PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: A. R. Reid , 1974, p. 343.

Consideraciones históricas: Reid (1974) introdujo este término para identificar la unidad media inferior del Grupo Roraima al cual subdividió en cuatro formaciones. Algunos autores se han referido a la unidad con la ortografía errónea de Kukenan.

Localidad tipo: Valle del curso medio del Río Cuquenán, 12 kilómetros al NE de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, estado Bolívar. Hoja de Cartografía Nacional No. 7930 a escala 1:100.000.

Descripción litológica: Lutitas limolíticas fisiles de colores variables que van desde el violeta al amarillo, con algunas láminas rojizas intercaladas. Las lutitas están pobremente endurecidas, son plásticas y parten fácilmente a lo largo de los planos de estratificación.

Espesor: Reid (*op. cit.*) estima un espesor variable, entre 50 y 100 metros. Contactos: La Formación Cuquenán es concordante sobre la Formación Uairén, unidad basal del Grupo Roraima y está cubierta concordantemente por la Formación Uaimapué suprayacente.

Paleoambientes: De acuerdo a Reid (1972) la Formación Cuquenán se formó luego de un relativo largo período de lenta depositación de lodos y arcillas, la cual pudo haber tenido lugar, luego de una incursión de ambiente marino, en un lago de aguas someras.

Edad: Precámbrico (véase: Grupo Roraima).

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Reid, A. R., 1972. ??

Reid, A. R., 1974. Stratigraphy of the type área of the Roraima Group, Venezuela. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 343-354.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)