




CRETACICO (principalmente Albicense)

Estado Sucre

Referencia original: H. L. Metz, 1965-a, p. 84.

Consideraciones históricas: Metz (1965-a) introdujo este nombre en un resumen y poco después (1965-b), publicó una descripción más amplia de la formación.

Localidad tipo: Río Cutacual, Sucre oriental, por una distancia de dos kilómetros al norte de su confluencia con el río Agua Fría.

Extensión geográfica: La unidad se reconoce únicamente en Sucre oriental, al norte y sur de la falla de El Pilar.

Descripción litológica: Calizas de color oscuro, textura fina, finamente laminadas, lenticulares a discoidales (sic), con abundantes foraminíferos y lutitas interestratificadas de color más claro, astillosas a pobremente fisiles, en parte calcáreas, bituminosas y carbonáceas. Las calizas interestratificadas de tipo microcristalino, más gruesamente bioclástico, se consideran como lenguas de la Formación El Cantil. La Formación Cutacual es muy semejante a la Formación Querecual, pero su posición en la secuencia cretácica es considerablemente más baja.

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) señalan que la formación en el sector Cangrejal-río Coicual del estado Sucre se presenta como un conjunto lutáceo, con algunas capas delgadas de calizas, que se pueden dividir en dos facies. Cubre una superficie importante que va desde la falla de Guaruta al oeste hasta el río Coicual al este. La mitad inferior esta compuesta por marlitas gris oscuro, bien estratificadas, a veces nodulosas que meteorizan a marrón. Dentro de estas marlitas se encuentran capas delgadas de calizas de color gris oscuro, muy finas. En la mitad superior, las calizas desaparecen y las marlitas más oscuras presentan una laminación fina cuando se acercan al tope, cerca del contacto con la Formación Querecual.

Espesor: Desconocido.

Contactos: Aunque la estructura es compleja y los afloramientos son restringidos, la base de la Formación Cutacual aparentemente se presenta a sólo poca distancia por encima del tope de la Formación Barranquín, en una secuencia que incluye la parte inferior de la Formación El Cantil. En el único afloramiento del contacto superior, la Formación San Antonio la suprayace discordantemente con ausencia de la Formación Querecual por erosión.

Fósiles: Bolt (*vide* Metz) comparó las ricas faunas de foraminíferos de la unidad con las de la Zona de *Praeglobotruncana rohri*, reconocidas en la Formación Maridale de Trinidad.

Según Furrer y Castro (*op. cit.*) la mitad inferior de la formación contiene bivalvos; gasterópodos; icnofósiles; Belemnites; Ammonites, foraminíferos plánticos representados por *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella planispira*, *Hedbergella* cf. *maslakovae*; foraminíferos bénticos tales como *Dentalina* cf. *distincta*, *Epistomina* cf. *chapmani*, *Gavelinella barremiana*, *Globorotalites aptiensis*, *Lenticulina* cf. *acuta*, *Lenticulina* sp., *Marginulina* sp., *Marssonella* aff. *trochus*, *Pleurostomella* cf. *subnodosa*, *Tristix acutangula*, *Valvulineria gracillima*. Entre los nannofósiles calcáreos encontrados tenemos *Chiastozygus litterarius*, *Corolithion achylosum*, *Cribrosphaerella primitiva*, *Cruciellipsis chiesta*, *Eprolithus floralis*, *Lithastrinus floralis*, *Lithraphidites carniolensis*, *Manivittella pemmatoidea*, *Nannoconus minutus*, *Nannoconus* sp., *Parhabdolithus angustus*, *Parhabdolithus embergerii*, *Parhabdolithus infinitus*, *Stephanolithion laffitei*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Zygodiscus diplogrammus*.

Los fósiles encontrados en la mitad superior son bivalvos; gasterópodos; foraminíferos plánticos *Globigerinelloides bentonensis*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella gorbachikae*, *Hedbergella planispira*, *Hedbergella simplex*, *Planomalina buxtorfi*, *Praeglobotruncana* cf. *stephani*, *Praeglobotruncana* cf. *delrioensis*, *Ticinella* cf. *primula*, *Ticinella* cf. *raynaudi*, *Ticinella roberti*; foraminíferos bentónicos representados por *Bathysiphon* sp., *Bolivina* spp., *Conorotalites aptiensis*, *Epistomina* cf. *spinulifera*, *Epistomina spinulifera*, *Epistomina spinulifera* polypoides, *Epistomina cretosa*, *Gavelinella intermedia*, *Gavelinella* spp., *Globorotalites aptiensis*, *Lenticulina* cf. *acuta*, *Lenticulina* cf. *munsteri*, *Lenticulina turgidula*, *Osangularia*

brotzeni, Spiroplectammina lata, Spiroplectammina annectens, Textulariella sp., *Tritaxia* cf. *plummerae*, *Valvulineria gracillima, Virgulina* spp. La nannoflora calcárea esta representada por *Chiastozygus litterarius, Corolithion achylosum, Cruciellipsis chiesta, Eiffellithus turriseiffelii, Eprolithus floralis, Lithraphidites carniolensis, Manivitella pemmatoidea, Nannoconus* sp., *Parhabdolithus embergeri, Parhabdolithus angustus, Parhabdolithus infinitus, Parhabdolithus splendens, Prediscosphaera cretacea, Watznaueria barnesae, Watznaueria biporta, Zygodiscus diplogramus* (Furrer y Castro, *op. cit.*).

Edad: Cretácico, principalmente Albiense, con posible extensión al Aptiense y el Cenomaniense. Según Furrer y Castro (*op. cit.*) el conjunto fosilífero data las rocas de la mitad inferior como Aptiense Temprano al tope del Aptiense Tardío y a la mitad superior como Albiense Medio a Tardío.

Correlación: Por su edad y su aparente interdigitación con La Formación El Cantil, la Formación Cutacual se correlaciona con ésta. Metz sugiere que representa una facies euxínica local, desarrollada en lagunas aisladas por arrecifes y bancos de arena. En Venezuela occidental, el Miembro Machiques de la Formación Apón presenta un caso similar de facies euxínica local en el Aptiense-Albiense, rodeada de calizas bioclásticas litológicamente similares a la Formación La Luna (y Formación Querecual correlativa), pero apreciablemente más antigua. En Trinidad, la Marga de Maridale representa el mismo intervalo cronológico que la Formación Cutacual.

Paleoambientes: Ambiente de baja energía, bien oxigenado, con presencia de corrientes de aguas frías, de surgencia sobre fondos lodosos, ricos en materia orgánica (Furrer y Castro, *op. cit.*)

© M. E. M, 1997

Referencias

Metz, H. L., 1965-a. Stratigraphy and geologic history of extreme eastern Serranía del Interior, State of Sucre, Venezuela. Resumen: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(3): 84 p.

Metz, H. L., 1965-b. Definition of the Cutacual Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(4): 107-109.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)