


**PALEOZOICO TEMPRANO (Ordovícico)**

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín Bellizzia, 1961, p. 1469.

Consideraciones históricas: Martín (1961) le asignó este nombre a los niveles superiores de las metasedimentarias del Grupo El Barbasco, a las que estudió en detalle. Anteriormente, esta unidad, junto con las restantes rocas metamórficas sin diferenciar de El Baúl, había sido mencionada por Liddle (1928 y 1946) y por Bucher (1952), y descrita superficialmente por Feo-Codecido (1955).

Localidad tipo: Estribaciones meridionales de la fila Teresén, región de Cañaote, El Baúl, distrito Girardot, estado Cojedes, Hojas 6542 y 6543, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La unidad se compone de cuarcitas micáceas orientadas (60%), interestratificadas en su parte media y superior con meta-areniscas arcósicas lenticulares, ligeramente foliadas, de grano grueso pobremente escogido y de color blanco, y por hornfelses samíticos, densos y de color verde azulado, que meteorizan a blanco y rojo violáceo; son excelentes capas guías y desarrollan lentes afaníticas que representan facies andalusíticas. Martín (1961) le asigna a esta formación un metaconglomerado lítico, que denominó Seudo-gneis de Cayetano, que aflora en un solo sitio 1 km al sur del Hato Piñero.

La unidad se halla atravesada por vetas de cuarzo brechado de 1,5 a 2 m de espesor; sufrió un metamorfismo regional de bajo grado, al que se sobreimprimió un metamorfismo de contacto y metasomatismo, causados por la intrusión granítica.

Espesor: Se estima en unos 300 m.

Extensión geográfica: La formación aflora en las filas de Teresén y Cañaote, en los cerros de Piñero, Casupal y Silva, macizo de El Baúl, estado Cojedes.

Contactos: La Formación Cañaote presenta un contacto gradacional con la Formación Cerrajón, y se coloca donde se comienzan a desarrollar los horizontes arcósicos. El contacto superior con la sección basal del Grupo volcánico de Las Guacamayas, es discordante y de falla.

Fósiles: No se mencionan fósiles de esta formación.

Edad: Por su posición estratigráfica en el tope de un grupo de metasedimentos de edad cambro-ordovícica, y por hallarse intrusionada por un granito del carbonífero, Martín, B. (1961) asigna esta Formación, al Paleozoico Inferior.

Correlación: Martín (1961) correlaciona la unidad con la Formación Carrizal del subsuelo de Guárico meridional, y con parte de la Formación Mucuchachi, en el flanco suroriental de los andes.

Paleoambiente: El ambiente depositacional es considerado de plataforma inestable, con regresión marina a continental.

© **Peter Moticska N., 1977**

Referencias

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, p.113.

Feo-Codecido, G., 1955. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. (Venezuela)* 3(8): 109-121.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. Mac Gowan, Fort Worth, Texas, p. 552.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2da. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, p.890.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. Publ. Esp.* N° 3, 4: 1453-1530.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Stover, L. E., 1967. Palynological dating of the Carrizal Formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 10(10): 288-302.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)