




TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Miranda

Referencia original: P. J. Bermúdez, 1966, p. 345-346.

Consideraciones históricas: Bermúdez (1966) introdujo este nombre para designar lutitas expuestas cerca de Carenero en la costa oriental del Estado Miranda, que se diferencian de otras rocas terciarias en el valle inferior del río Tuy por su contenido microfaunal; estos sedimentos se incluían antiguamente en la Formación Aramina.

Localidad tipo: Carenero, Estado Miranda.

Extensión geográfica: Hasta el presente sólo se reconoce en la localidad tipo.

Descripción litológica: Lutita calcárea suave, compacta y maciza, de color gris claro, que meteoriza en tonos castaños.

Espesor: Unos 15 metros expuestos, aunque se presume mayor.

Contactos: No observados; se presume su discordancia sobre las metamórficas de la Cordillera de la Costa y su posición estratigráfica infrayacente a la Formación Aramina.

Fósiles: Bermúdez (1963) enumera foraminíferos bentónicos y planctónicos. No se ha determinado si los moluscos de la Formación Aramina mencionados por Dusenbury (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*), corresponden a ésta en su sentido restringido actual o a la Formación Carenero. Bolli y Bermúdez (1965) y Bermúdez (1966) establecen la correspondencia de la fauna de foraminíferos con la Zona de *Globorotalia menardii*; sin embargo, Bermúdez (1966) cite la especie *Globorotalia acostaensis*, determinante de la zona del mismo nombre (Bolli y Bermúdez, 1965; Bolli, 1966). Ambas zonas pertenecen al Mioceno superior.

Edad: Mioceno superior.

Correlación: Bermúdez (1966) correlaciona la unidad con parte de las "Capas de La Tejita" en Margarita y con parte del Miembro Cerro Verde de la Formación Cubagua; provisionalmente postula su equivalencia también con las Capas de La Sabana en el Distrito Federal, a su vez posibles correlativas de la Formación Las Pailas, Grupo Cabo Blanco.

Referencias

Bermúdez, P. J., 1963. Foraminíferos de las lutitas de Punta Tolete, Territorio Delta Amacuro, Venezuela. "Geos", Univ. Cent. Venez., Caracas, (8): 35-38. Reimpreso en: Rivero, F. CH. de y P. J. Bermúdez, 1963. Micropaleontología general, (Univ. Cent. Venez. Caracas, 808 p.), apéndice, p. 765-768. Resumen en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(9): 263.

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planitonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planitonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. *Léxico Estratigráfico de Venezuela*, Pub. Espec. N° 1, *Bol. Geol.*, p. 728.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)