




CRETACICO (Albiense Temprano)

Serranía del Interior

Referencia original: F. G. Yoris V., 1985.

Consideraciones históricas: Este término fue introducido por Yoris (1985), para designar la parte basal, lutítico-carbonática-arenosa de la Formación Chimana en la región al sur de la Serranía del Interior.

Posteriormente, (Yoris, 1988-a) se le asignaron secciones de referencia en el flanco norte del anticlinal de cerro Grande, en las vías Aragua de Maturín-Guanaguana y Cueva del Guácharo-San Agustín, estado Monagas. Suprayace concordantemente a la Formación El Cantil e infrayace, también de forma concordante al Miembro Corral Viejo en la región de Caripe y al Miembro Caripito en la región de río Caripito, al oeste de la población del mismo nombre (estado Monagas). Aún no se ha estudiado su posible extensión, al norte de la Serranía del Interior. Lateralmente, puede ser equivalente a las facies arenosas del Miembro Punceres (Capas de Punceres, Yoris, 1985) de la Formación El Cantil (Yoris, 1988-a, 1988-b).

Véase [CHIMANA, Formación](#).

© *Franklin G. Yoris V., 1997*

Referencias

Yoris, F. G., 1985. Revisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo A.; Ríos, J. H. y Bellizzia, N. P. de (Eds.). *IV Congreso Geológico Venezolano. Soc. Ven. Geól.*, Caracas; Memoria 2: 1343-1393.

Yoris, F. G., 1988-a. Localidades tipo para los miembros de la Formación Chimana en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geól.*: (en prensa).

Yoris, F. G., 1988-b. Localidades tipo y secciones de referencia para los miembros de la Formación El Cantil, en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geól.*, Caracas: (en prensa).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)