


**CRETACICO TEMPRANO**

Estado Lara

Referencia original: J. R. Bushman, 1959, p. 66.

Consideraciones históricas: Este nombre fue empleado por Bushman (1959), para designar una secuencia de lutitas, calizas, areniscas, cuarcíticas y margas alteradas por metamorfismo de bajo grado, expuestas al norte de Barquisimeto. Según coronel y Renz (1960) la Formación Carorita de Bushman incluye unidades heterogéneas cuyas edades se extienden desde el Cretáceo inferior hasta el Eoceno-Paleoceno, heterogeneidad debida al problema de masas alóctonas del Cretáceo y Terciario más antiguo, embebidas en lutitas el Terciario inferior. Estos autores separaron las siguientes unidades litológicas en el intervalo de la formación Carorita original de Bushman, en orden descendente: Caliza Azul., Caliza de Carorita, Formación La Osa, Lutitas Caoliníticas y Areniscas Cuarcíticas, Lutitas y Terciario no diferenciado en Facies "Flysch". Von Der Osten (1966) a base de informes inéditos de Kiewier De Jonge y Coronel, publicó una descripción y mapa de la sección tipo designada por estos para la unidad.

Bellizzia y Rodríguez (1966) La Osa, incluyeron las unidades La Osa, Carorita y Caliza Azul, en la Formación Carorita, considerada por ellos como un gran bloque alóctono de su Formación Mamey y designaron a la parte inferior, arenácea, de la Formación Carorita, original de Bushman con el nombre de Formación Bobare. Más recientemente Bellizzia (1986) y Macsotay *et al.*, (1987) reconsideran algunos aspectos de la Formación Carorita, asignándola definitivamente al Cretáceo inferior.

Localidad tipo: Al norte de Barquisimeto la sección comienza en el caserío Carorita Arriba y continúa hacia el sur hasta el cerro Las Minas. Hoja 6346, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La Formación Carorita está formada, fundamentalmente, de calizas arenáceo-feldespáticas de grano grueso en capas macizas, lutitas, margas, conglomerados calcáreos a veces guijarrosos y en algunas localidades conglomerados de peñones en los cuales se presentan fósiles del Cretáceo inferior (Bellizzia, 1986).

Espesor: Bushman (1959, 1965) y Bellizzia y Rodríguez (1967) concuerdan en la cifra de 500 m de espesor para esta unidad. Coronel y Renz (1960) midieron 760 m aunque admiten que la cifra es dudosa por los pliegues "recumbentes" especialmente frecuentes en los afloramientos septentrionales de la formación.

Extensión geográfica: Se presenta en forma de una gran masa de unos 8 Km de longitud máxima en sentido este-oeste y 3,5 kilómetros de anchura, situada al suroeste de Carorita Arriba y unos 3 kilómetros al norte de Barquisimeto.

Expresión topográfica: La formación Carorita, meteoriza en forma parecida a la Formación Barquisimeto, tiende a formar lomas redondeadas con poca vegetación donde el caliche secundario oculta gran parte de los afloramientos. Sus colores de meteorización, especialmente a distancia son parecidos, lo que puede confundirlos con facilidad.

Contactos: Según Macsotay *et al.*, (1987) su contacto inferior en el área tipo es una falla de corrimiento con respecto a las formaciones Barquisimeto y Matatere. El contacto superior en el área tipo es de discordancia angular y erosional con la Formación La Osa. Hacia el oeste este mismo contacto es con la Formación Barquisimeto inferior. Hacia el norte en el área de Carorita Abajo, el contacto de la Formación Carorita es transicional con la suprayacente Formación Bobare. Hacia el este, la Formación Carorita pasa gradualmente a la Formación Mamey del Grupo Los Cristales (Bellizzia y Rodríguez, 1967).

Fósiles: Bushman (1965) Von Der Osten (1967) Bellizzia (1986) Macsotay *et al.*, (1987) citan faunas de foraminíferos y amonites principalmente entre las que sobresalen: *Neotrocholina valdensis*, *Olcostephanus* (O.) c.f. *asterianus*, *Leptoceras* sp., *Ancyloceras* sp., *Hamites*, *Idiohamites* y *Pseudohelicoceras*, además de *Hemiptycoceras* cf. *gaultinum* mencionado por Macsotay (1972).

Edad: El conjunto faunal mencionado anteriormente sugiere que la Formación Carorita cubre la mayor parte del Cretáceo inferior: Valanginiense, Hauteriviense, Barremiense, Albiense (Macsotay *et al.*, 1987).

Correlación: Bushman (1959, 1965) correlaciona la formación con el Grupo Cogollo, Coronel y Renz (1960) la correlacionan con la Formación Los Cristales de Bushman, y parte superior de la Formación Mapuey. Bellizzia y Rodríguez (1966, 1967) la consideran como bloque alóctono de la Formación Mamey.

Bellizzia (1986) menciona que la secuencia sedimentaria representada por las formaciones Mamey, Volcancito y Carorita "presenta características petrológicas semejantes y a su vez puede correlacionarse con las formaciones Araure, Agua Blanca, Cojedes, y Mapuey de la región de Acarigua-San Carlos". Macsotay *et al.*, (1987) correlacionan a la Formación Carorita con las formaciones Mamey, Las Mercedes, Carúpano y posiblemente Nirgua.

Paleoambiente: Coronel y Renz (1960) opinaron que la formación Carorita se sedimentó en ambiente de poca profundidad y en aguas claras. El carácter de la litología, la fauna y la icnofauna sugieren un origen hemipelágico de ambiente batial o abisal (Macsotay *et al.*, 1987)

Sinonimia: Caliza Azul, Caliza de Carorita, Lutitas Caoliníticas, Areniscas Cuarcíticas.

© **Oscar Odreman, 1997**

Referencias

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto Area a Summary Report. *Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 3-11.

Bellizzia, A., 1986. Sistema montañoso del Caribe: Una Cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. *VI Cong. Geol. Venez.*, 10: 6657-6836.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Bol. Geol.* 8(16): 289-309.

Campos V., V. Guedez y S. Osuna, 1979. Geología de la Serranía de Portuguesa, Edos. Portuguesa, y Lara, *Bol. Geol.*, 13(25): 3-47.

Coronel, G. y O. Renz, 1960. Los deslizamientos submarinos al Noroeste de Barquisimeto, Estado Lara., *Bol. Geol.*, Esp. 3: 743-760.

Macsotay, O., 1972. Observaciones acerca de la edad y paleoecología de algunas formaciones de la región de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. *Bol. Geol.*, Public. Esp. 5(3): 1673-1701.

Macsotay, O.; J. F. Satephan y E. Alvarez, 1987. Grupo Lara: Sedimentitas oceánicas y peninsulares en el Cretáceo alóctono de Venezuela occidental. *Bol. Geol.* 16(28): 3-78.

Von Der Osten, E., 1967. Stratigraphy of Central Lara. *Asoc. Venez. Geol., Min. Petrol.*, Bol. Inform., 10(11): 309-332.

Von Der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del Edo. Lara, Región de Quíbor. *Bol. Geol.*, 4(9): 3-52.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bellizzia, A. y D. Rodríguez G., 1966. Guía de la exursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía N° 4, 23 pp.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)