


**CAMBRICO TEMPRANO**

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1942, p. 200.

Consideraciones históricas: Hedberg (1942) publicó la primera referencia a la Formación Carrizal, reconocida en el pozo Carrizal N° 1, en el subsuelo de Anzoátegui. Stover (1967) postuló una edad Devónico-Carbonífero, en base a estudios palinológicos. Di Giacomo (1985) y Sinanoglu (1986) establecieron la edad Cámbrico temprano, a partir de estudios de acritarcos en núcleos de pozos del sector Zuata, de la faja petrolífera del Orinoco. Funes (1985) la mencionó en pozos del norte del sector Hamaca de la misma Faja, y Jam y Santos (1989) informaron de su posible extensión al sector cerro Negro, de la Faja, en el sur de Monagas.

Localidad tipo: La sección tipo de la formación está en el pozo Carrizal 1, situado en el distrito Monagas del estado Anzoátegui, a unos 65 km al suroeste de Pariaguán, y a unos 40 km al sureste de Santa María de Ipire (Hoja 7141, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional), entre la profundidad de 1.111 m (3.645 pies) y el fondo del pozo a 1.598 m (3.645 pies). Esta sección corresponde a la parte superior de la unidad. Una sección de referencia representando la parte inferior, está en el pozo Zuata N° 1, aproximadamente 40 al sur-suroeste del Carrizal 1, entre las profundidades de 458 m (1.503 pies) y 777 m (2.550 pies).

Descripción litológica: La formación está constituida por una espesa secuencia de arcilitas verdosas a gris oscuro, duras, masivas y densas, ocasionalmente teñidas de rojo, duras y compactas. Contiene algunas capas de limolita y areniscas. Generalmente está fuertemente bioturbada. Es notablemente homogénea, pese a su contenido variable de limo, con intercalaciones locales de areniscas o conglomerados de guijarros. Intercaladas, y generalmente hacia la base de la formación, se han observado cuerpos de arena. Ocasionalmente, se presenta calcita como cemento en las capas de limolita y en diaclasas verticales.

Mineralógicamente, la unidad se caracteriza por granate, biotita, feldespatos, cuarzo, chert, muscovita y glauconita como minerales más comunes, y es claramente diferenciable en los registros eléctricos, en base a la respuesta de las curvas de rayos gamma y potencial espontáneo, típico de sedimentos lutíticos.

Espesor: En el pozo Carrizal 2X se han medido 1.827 m (5.975 pies), pero se supone que el espesor sea mucho mayor.

Extensión geográfica: Subsuelo de la parte meridional de los estados Guárico y Anzoátegui, y probablemente sur de Monagas.

Contactos: El tope de la Formación Carrizal es siempre erosional, estando cubierto por sedimentos precretácicos, por el Grupo Temblador o por la Formación Oficina. En la base suprayace a la Formación Hato Viejo, con la cual guarda estrecha relación.

Fósiles: Los únicos fósiles hallados en la Formación Carrizal son *acritarcos*, organismos unicelulares de afinidad incierta, los cuales han sido descritos en estudios publicados por Stover (1967), Di Giacomo (1985) y Sinanoglu (1986). En estos estudios se mencionan los géneros *Michrystidium*, *Dictyotidium*, *Gorgonios phaeidum*, *Gonios phaeidum*, *Leiosphaeridia*, *Skigiagia*, etc.

Edad: Stover (1967), al estudiar los *acritarcos* de la Formación Carrizal, le asignó una edad Devónico tardío a Missisipiano temprano, pero Di Giacomo (1985) y Sinanoglu (1986), basándose en nuevos conocimientos sobre estos fósiles, le han asignado una edad Cámbrico temprano.

Correlación: En pozos del área de Zuata se encuentran intercalaciones arenosas dentro de la Formación Carrizal, que presentan las características de la Formación Hato Viejo. Podría considerarse que, en su parte mas vieja, al menos, la Formación Carrizal equivale cronológicamente a la Formación Hato Viejo.

Paleoambientes: Las estructuras sedimentarias sugieren, que estas litologías fueron depositadas bajo condiciones de ambiente marino (nerítico), en aguas someras y condiciones de corriente típicas de llanuras de marea.

Referencias

Di Giacomo, 1985. ??????????????????

Funes, D., 1985. Tipos de acumulaciones de petróleo en el área de Hamaca. Sociedad Venezolana de Geólogos, Caracas, *VI Congr. Geol. Venez.*, 6: 3015-3036.

Hedberg, H. D., 1942. Mesozoic stratigraphy of northern South America. *8th. Am. Sci. Cong.*, U.S.A., 1940, Proc., 4: 195-227.

Jam L., P. y Santos, 1989. ??????????????????

Sinanoglu, 1986. ??????????????????????????????

Stover, L. E., 1967. Palynological dating of the Carrizal Formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 10(10): 288-302.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Feo-Codecido, G., 1953-1954. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 3(8): 109-121.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 58(8): 689-702.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am.*, Bull., 61(11): 1173-1216.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Martín Bellizzia, C., 1960. Estudio petrográfico de rocas provenientes de los cerros El Rodeo, Tausabana y Snata Ana. *III Cong. Geol. Venez.*, Mem., Caracas, 1959, 2: 729-742.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Am. Assoc. Petról. Geol.*, Bull., 37(13): 2705-2733.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)