


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

**Referencia original:** H. Takeda, P. Lira y C. Sosa, 1989, p. 238.

**Consideraciones históricas:** Takeda *et al.* (1989) introducen tentativamente este término formacional para designar rocas volcánicas ácidas a intermedias, equivalentes a la formación Caicara del Grupo Cuchivero, que afloran en la cuenca de los ríos Carum y Antabani afluentes del río Caroní y María afluente del río Paragua en la región sur-central del estado Bolívar. Proponen, con este término, elevar al rango de formación, al Miembro Carúm propuesto y descrito por Moreno *et al.* (1985) en la misma área.

**Localidad tipo:** Takeda *et al.* (*op.cit.*) indicaron como sección tipo la misma donde se describió al Miembro Carum "la zona del río Paragua comprendida desde 4 kms aguas abajo de la desembocadura del mismo (Carúm), municipio autónomo Raúl Leoni, estado Bolívar, (Hoja 7531, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

**Descripción litológica:** La unidad consiste esencialmente de riolitas, riodacitas y en menor cantidad dacitas, andesitas y basaltos que se encuentran intercaladas con rocas volcánicas recrystalizadas que contienen capas de tobas soldadas (ignimbritas). Los autores sugieren en la secuencia volcánica una recrystalización por metamorfismo sepultado y consideran que las rocas han alcanzado una facies metamórfica que va desde la prehnita-pumpellyita a la de esquistos verdes. Estas rocas muestran un rumbo general NNO y buzamiento casi vertical. Mencionan los autores la existencia de rocas intensivas ácidas (granito tipo Santa Rosalía) en el área del río Parupa, en contacto de falla con las volcánicas. Mencionan además intensivas intermedias de composición granodiorítica y cuarzo-dioritos, en el área del río Cuturí, que dejan una aureola de contacto en las metavolcánicas alrededor de los cuerpos intrusivos. Por último se mencionan rocas intrusivas básicas (diques doleríticos) que pertenecen a la serie toleítica y se componen de olivino, clinopiroxeno, biotita y plagioclasa con apatito. En el Caño Cuco (afluente del río Cutabani) se menciona una capa calcárea formando brechas con material orgánico (?) transformada a óxido de hierro. La textura parecida a la de stromatolitos del Precámbrico. La capa asociada con las rocas verdes y contienen yeso en algunas partes. Estiman los autores que tanto las rocas estrusivas como las estrusivas sean co-magmáticas en razón de la composición similar entre ellas. En esto coinciden con la opinión de McCandless (1965) en la descripción de su Asociación Ignea Cuchivero.

**Espesor:** No se indica en la descripción original.

**Extensión geográfica:** La formación aflora en los ríos paragua, Caño Mari (afluente), Caroní, Cutabari y Carum. El mayor desarrollo de la unidad se observa en el río Cutabani.

**Contactos:** No se mencionan relaciones estratigráficas, el contacto superior pudiera ser con rocas del Grupo Roraima.

**Fósiles:** Se mencionan stromatolitos indicativos de edad Precámbrico.

**Edad:** Precámbrico. Los autores consideran una edad 1900-1700 m.a. que correspondería a la orogénesis transamazónica.

**Correlación:** con la Formación Caicara.

Importancia económica: Moreno *et al.* (1985) recomendaron un estudio detallado (geológico-geoquímico) en las áreas donde aflora la unidad para la búsqueda de Bobre y Oro.

© J. H. Rios, 1997

**Referencias**

Takeda H., P. Lira y C. Sosa, 1989. Estudio petrológico de las rocas ígneas en la región de Carum-Antaban, Estado Bolívar. Mem. 50 Aniv. Esc. Geol. Minas y Geofísica, Universidad Central de Venezuela. *Geos.* 29:238-248.

Moreno, L., P. Lira y R. Tylki, 1985. Reconocimiento geológico del Alto Paragua. *I Simp. Amazonico*, Pto. Ayacucho, 1981. Ministerio de energía y Minas. Dir. de Geología. Public. Especial 10: 100-115.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)