




**MESOZOICO** (Triásico-Jurásico)?

Estado Sucre

**Referencia original:** H. G. Kugler, 1953, p. 29-30.

**Consideraciones históricas:** Kugler (1953) utilizó el nombre de Formación Dragón, para designar un típico augengneis, que en un principio consideró ser un paragneis, sin excluir que fuese un

basamento granítico. Cien años antes, Wall y Sawkins (1860) ya habían descubierto y descrito someramente el gneis. A partir de 1959, Kugler en sus diferentes publicaciones y mapas (Mapa Geológico de Trinidad, 1959), en los que se incluye este cuerpo, sustituyó el nombre de Formación Dragón por el de Gneis de Dragón.

Posteriormente, González de Juana *et al.* (1965) definieron una sección tipo y consideran que se trata de un paragneis, producto de la alteración metasomática de la Formación Macuro. Rodríguez (1968-a) también habla de un intenso metasomatismo alcalino, producto de intrusiones ácidas sobre rocas pelíticas. Kugler (1972) publica nuevas consideraciones sobre el Gneis de Dragón (además de una datación geocronológica), y opina que es una enorme masa deslizada, o quizás un basamento pérmico o cretácico. Este autor no hace distinción entre el Gneis de Dragón, y los otros cuerpos de gneises graníticos que se intercalan en la Formación Macuro. González de Juana *et al.* (1972) publican una descripción petrográfica detallada, y reafirman su opinión sobre el origen metasomático alcalino del Gneis de Dragón; sugieren además, una relación genética de este gneis con los otros cuerpos gnéisicos de la Formación Macuro. Navarro (1974) realizó estudios químicos comparativos entre el Gneis de Dragón y el Granito de El Mango-Doña Juana, y determinó que son mineralógica y químicamente correlacionables.

**Localidad tipo:** Promontorio de Paria, desde la ensenada del Obispo Sur, hasta la playa de Los Cocos, a 2 Km al este de la punta Don Pedro, península de Paria, estado Sucre. (Hoja 7747, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

**Descripción litológica:** El Gneis de Dragón es un paragneis u ortogneis (ver Petrogénesis) cuarzo-feldespático-micáceo-clorítico de granularidad variable, desde grano fino con aspecto esquistos, o hasta de grano grueso con cristales alargados de ortosa, hasta de 2,5 cm (augengneis). Las variedades finas, son de color verdoso y las más gruesas de color blanquecino y verdoso. Meteoriza a tonos verdosos, rosados y amarillentos. Presenta además, intercalaciones de esquistos cloríticos similares a los de la Formación Macuro, con espesores variables, desde pocos centímetros hasta más de 10 m, y delgadas intercalaciones lenticulares ricas en actinolita.

**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Existen aún considerables divergencias de opinión acerca de la génesis del Gneis de Dragón; se pueden resumir de la siguiente manera:

#### a) Ortogneis

- Basamento granítico pérmico tardío o triásico (H. Hess y H. Kugler en Kugler, 1972).
- Cuerpo granítico de basamento deslizado o imbricado (Kugler, 1972).
- Intrusión premetamórfica en la Formación Macuro (E. Navarro, en González de Juana *et al.*, 1974).

#### b) Paragneis

- Metasomatismo alcalino de sedimentos pelíticos debido a una intrusión granítica que no aflora (González de Juana *et al.* 1965 y 1972; Rodríguez, 1968).

El grado metamórfico es bajo, y se coloca en la facies de los esquistos verdes, subfacies cuarzo-albita-epidoto-biotita, de un metamorfismo dinamo-termal regional.

**Contactos:** El Gneis de Dragón, ocupa el nivel medio de la porción oriental de la Formación Macuro (en Venezuela). Según Kugler (1952), el cuerpo presenta una longitud de 10 Km, un espesor aproximado de 2000 m y la foliación, un rumbo general NE-SO, y un buzamiento de 55 SE. Los contactos laterales del gneis con la Formación Macuro, se describen como graduales e interdigitados entre el augengneis y el esquisto cuarzo-clorítico-muscovítico, respectivamente. E. Navarro (González de Juana *et al.*, 1974) sugiere que el Gneis de Dragón

representa la zona de borde de la intrusión granítica, mientras que la Asociación Igneo-Metamórfica de El Mango-Doña Juana, puede formar parte de la zona central del plutón.

**Edad:** Existe una sola edad radimétrica poco precisa, realizada por E. Jaeger (en Kugler, 1972) por el método Rb/Sr en roca total:  $230 \pm 100$  m.a., lo cual significa un amplio rango de edad desde el Paleozoico Medio al Mesozoico Medio. Ciertamente, excluye la posibilidad de un basamento precámbrico. González de Juana *et al.* (1974) proponen que el magmatismo ocurrió al cierre del Jurásico, y el metamorfismo en el Cretáceo Superior. A modo de comparación, la edad radimétrica (método K/Ar en hornblenda obtenida por Santamaría (en González de Juana *et al.*, 1974), en rocas de la Asociación Igneo-Metamórfica El Mango-Doña Juana, es de  $128 \pm 11$  m.a.

**Extensión geográfica:** Extremo nororiental de la península de Paria, desde la ensenada de El Palmar, hasta la ensenada y quebrada Cariaquito. No aflora en Trinidad.

**Correlación:** El Gneis de Dragón se ha correlacionando genéticamente con los otros cuerpos ígneo-metamórficos, intercalados en la formación Macuro y que son: la Asociación Igneo-Metamórfica El Mango-Doña Juana, y los gneises graníticos de La Yaguara, La Horqueta, de la quebrada de Mauro, del Hoyo y del río Izquierdo. En forma indirecta se le compara (H. Hess en Kugler, 1972) con el Gneis de Sebastopol (Complejo Basal de Sebastopol, premesozoico), con el Gneis de Peña de Mora (Formación Peña de Mora, Mesozoico?, Precámbrico?).

© **Peter Moticska N., 1997**

### Referencias

González de Juana, C., N. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria, Bol. Inform. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., 8(9): 255-279.

González de Juana, C., N. G. Muñoz y M. Vignali, 1972. Reconocimiento geológico de la Península de Paria, Venezuela, Bol. Geol., Pub. Espec. 5, 3: 1549-1588.

González de Juana, C., F. Santamaría, E. Navarro, 1974. A few considerations on the age, origin and relations of the Dragon Gneis, Paria Península, Venezuela, *Verh. Nat. Ges. Basel*, 84(1): 153-163.

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to Recent sedimentary environments in Trinidad, *Ver. Schweiz. Petr. Geol. Ing. Bull.*, 20(59): 27-60.

Kugler, H. G., 1972. The Dragon Gneis of Paria Península Eastern Venezuela, *Mens. 6th Carib. Geo. Conf.*, p. 113.116.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 1-728.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 4: 1-756.

Navarro, 1974. ?????????????????????????????????????????????????????????????

Rodriguez, S., 1968. Estudio sobre el metamorfismo en la Península de Paria, Estado Sucre, Bol. Inform., Asco. Ven. Geol. Min. Petr., 11(3): 61-88.

Wall, G. P. y J. G. Sawkins, J. G., 1860. Report on the geology of Trinidad, *Geo. Survey. Mem.* (London), p. 211.

### Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 58, p. 689-702.



**2a Edicion LEV**



**Comentarios Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)