


**MESOZOICO**

Estado Aragua

Referencia original: R. Shagam, 1960, P. 591

Consideraciones históricas: Shagam (1960) definió a la Formación El Caño, como unidad basal del Grupo Villa de Cura, Königsmark (1965) y Oxburgh (1965) siguieron este criterio, pero Sieders (1965)

inverció la secuencia del grupo, colocando a la Formación El Caño en el tope. Piburn (1968) describió en detalle la unidad, situándola en el orden originalmente establecido por Shagam (*op. cit.*). Navarro (1983) adoptó también la secuencia invertida, indicando que las formaciones El Caño y El Chino no son cartografiables separadamente, y en conjunto constituyen su [Unidad de Metatobas](#), la más joven de las tres unidades informales en que subdividió al Grupo Villa de Cura. Beets *et al.* (1984) analizaron muestras de la unidad, comparándolas con la Formación Washikemba, de Bonaire, en base a la similitud de los flujos de andesita basáltica.

Localidad tipo: Río El Caño, afluente del río El Pao, a unos 6 km al noroeste de San Sebastián, distrito Zamora, estado Aragua (Hojas 6745 y 6746, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Se encuentran buenos afloramientos en los ríos Caramacate y Tiara.

Descripción litológica: Shagam (1960) indica que la litología predominante es la metatoba afanítica máfica, laminada, de color azul, que constituyen el 70% de la Formación; metatoba máfica de color azul verdoso intenso, de grano medio, maciza y generalmente foliada, que constituye el 20%; metachert y metaarenisca cada uno en proporción menor del 5%. Königsmark (1965) mencionó además esquisto macizo epidótico - clorítico - albítico - cuarífero. Seiders (1965) en la zona de Caucagua también encuentra esta Formación pero más foliada.

Según Piburn (1968), la Formación El Caño está compuesta en un 75%, por metatobas máficas, finamente laminadas, con intercalaciones de filitas negras. Las metatobas son agregados muy finos de albita no maclada, pumpellita y clorita con cantidades menores de actinolita, sericita, estilpnomelano, cuarzo, calcita, clinopiroxeno y hornablenda. Otros integrantes de la formación son filitas marrones (10%) laminadas, compuestas por láminas máficas de albita-clorita-pumpellita-epidoto o sálicas de albita-sericita-calcita; hay abundancia de hematita fina. En la base de la formación se encuentran conglomerados volcánicos (10%), con fragmentos volcánicos de ftanita negra. El 5%, remanente de la composición de la formación, lo constituyen metalavas y sills hipoabisales, en los cuales entran metabasalto, metaandesita porfirítica y diabasa cuarzo-piroxénica.

Navarro (1983) presenta un estudio geoquímico y petrográfico detallado de las rocas del Grupo Villa de Cura, determinando que las rocas de esta Formación fueron sometidas a un metamorfismo de muy bajo grado en la zona de la pumpellita - actinolita y parcialmente en la zona de la lawsonita - albita.

Navarro *et al.* (1987, 1988) recomiendan redefinir esta Formación como semejante a la Formación El Chino, pero con una mayor abundancia de tobas laminadas por sedimentación subacuática y mayor proporción de sedimentos retrabajados del arco volcánico, con intercalaciones de sedimentos finos de origen marino.

Espesor: Piburn (1968) estimó en la localidad tipo de la formación, un espesor estimado de 1.400 m.

Extensión geográfica: La Formación El Caño aflora como una franja en la parte septentrional de la Serranía del Interior, en los estados Carabobo, Aragua, norte de Guárico y Miranda.

Contactos: En la parte meridional de la zona de afloramientos, en su base, la unidad está en contacto de falla con la Formación Paracotos. En el tope pasa, al parecer, concordantemente a la Formación El Chino. Según Shagam (*op. cit.*), el contacto está marcado por un cambio de metatobas laminadas a metatobas bandeadas.

Fósiles: No se han encontrado.

Edad: Se estima Mesozoico sin diferenciar.

Correlación: Dada la naturaleza alóctona del Grupo Villa de Cura, la correlación de sus unidades con otras conocidas, es actualmente tentativa. Beets *et al.* (*op. cit.*) encuentran similitud textural y química con la Formación Washikemba, de Bonaire.

Sinonimia: Parcialmente sinónimo a la Unidad de metatobas de Navarro (1983).

Véase [VILLA DE CURA, Grupo](#).

© **P. Jam L., 1997**

(Actualizado por: F. Urbani, julio 1997)

Referencias

Beets, D. J., W. Maresch, G. T. Klaver, A. Mottana, R. Bocchio, F. Beunk y H. Monen. 1984. Magmatic rock series and high-pressure metamorphism and constraints on the tectonic history of the Southern Caribbean. En: W. E. Bonini, R. B. Hargraves y R. Shagam (Eds.) The Caribbean South America plate boundary and regional tectonics. *Geol. Soc. America*, Memoir 162, p. 95-130.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

Navarro, E., 1983. Petrología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo Villa de Cura. *Revista Geos*, Caracas, 28: 170-317.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1987. Revisión y redefinición de las formaciones: El Carmen, Santa Isabel, El Chino, El Caño, Escorzonera y Garrapata, Venezuela Norte Central. *Iras. Jornadas de Investigación en Ingeniería*, UCV, Caracas, Memorias, p. 64-70.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico medio - Paleogeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Piburn, M. D., 1968. Metamorfismo y estructura del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.

Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.

Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formations of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260.

Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Menéndez, V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 64(1): 41-64.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)