


**TERCIARIO** (Eoceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: F. De Rivero, 1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela, p. 534.

Consideraciones históricas: El nombre Formación El Dátil fue publicado por primera vez por De Rivero (1956), para designar la unidad intermedia del Grupo Punta Carnero, descrito por González de Juana (1947). Kugler (1957) y Taylor (1960), designaron el mismo intervalo con los nombres inválidos de Horizonte Inferior de Orbitoides y Miembro Intermedio de Lutitas, de la Formación Punta Carnero. Jam y Méndez (1962) y Bermúdez y Gámez (1966), siguieron la nomenclatura empleada en el Léxico Estratigráfico de Venezuela (1956). González de Juana (1968) suministró información adicional y González de Juana *et al.* (1980), describieron el grupo y sus formaciones en detalle. Muñoz (1973) asignó rango formacional al Grupo Punta Carnero, sin definir una subunidad equivalente a la Formación El Dátil.

Localidad tipo: La sección tipo está ubicada en la quebrada El Dátil, unos dos km aguas arriba de su desembocadura, cerca del caserío El Manglillo, distrito Díaz, estado Nueva Esparta.

Descripción litológica: La parte basal de la sección está constituida por limolitas gris-verdoso y areniscas calcáreas gris y lutitas calcáreas, con algunas intercalaciones de calizas con orbitoides. Hacia la parte superior, predominan las lutitas de color gris claro que pasa a amarillento por meteorización, con intercalaciones de areniscas de grano fino, calcáreas. El intervalo contiene también cristales de yeso y concreciones ferruginosas elipsoidales y discoidales, de color rojizo a púrpureo.

Muñoz indica que la secuencia es un flysch calcarenítico, constituido por una alternancia monótona de calizas bioclásticas (biocalcarenitas, biocalcilimolitas, biocalcilutitas) y lutitas pelágicas, con algunas intercalaciones de grauvacas calcáreas. Hacia la parte inferior de la sección, la estratificación es más gruesa y con mayor proporción de biocalcarenitas de color gris. Hacia la parte superior, la estratificación es más fina, con predominio de lutitas, biocalcilimolitas y biocalcilutitas de color amarillento.

Espesor: En la sección tipo, el espesor del intervalo es de 720 m.

Extensión geográfica: La extensión de esta unidad es muy limitada. Muñoz señala que "la litología de esta formación, sólo puede ser reconocida y cartografiada como tal, en el valle de El Dátil".

Contactos: La base de la unidad es transicional sobre la Formación Las Bermúdez. Hacia arriba, pasa transicionalmente a la Formación Punta Mosquito.

Fósiles: En la calizas orbitoidales, se han identificado los foraminíferos *Asterocyclina* sp., *Discocyclina* sp., *Proporocyclina Tobleri*, *Cymbalopora* cf. *irregularis* y *Cypsina globulus*. Otras especies presentes en la formación son, *Gumbelina goodwini* Cushman y Jarvis, *Nonion* cf. *micrus* Cole, *Bolivina taylori* Howe, *Operculinoides trinitatensis* Nutall, etc. (Jam y Méndez, 1962). Muñoz menciona a la siguiente asociación faunal en muestras procedentes del valle El Dátil: *Globorotalia* sp., *Globigerina senni*, *Globorotalia bolivariana* y radiolarios.

Según Castro, (1997, comentarios enviados al CIEN) en la base y hacia la parte media, la nannoflora calcárea está constituida por *Sphenolithus pseudoradians*, transición entre *Sphenolithus radians* y *Sphenolithus pseudoradians*, *Sphenolithus moriformis*, *Zyghrablithus bijugatus*, *Chiphragmalithus alatus*, *Reticulofenestra* cf. *dictyoda*, *Reticulofenestra* aff. *umbilica*, *Reticulofenestra* spp., *Helicosphaera* cf. *lophota*??, *Helicosphaera* sp., *Ericsonia cava*, *Ericsonia* sp., *Ericsonia formosa*, *Coccolithus pelagicus*, *Coccolithus eopelagicus*, *Discoaster* cf. *binodosus*, *Discoaster deflandrei*, *Discoaster* cf. *barbadiensis* y los dinoflagelados calcáreos, *Thoracosphaera saxeae* y *Thoracosphaera* sp. En la parte superior se observa *Sphenolithus pseudoradians*, *Reticulofenestra umbilica*, *Zyghrablithus biugatus*, *Ericsonia formosa*, *Ericsonia cava*, *Coccolithus pelagicus*, *Discoaster* sp., *Pontosphaera* sp., *Reticulofenestra* spp., *Discoaster* cf. *barbadiensis*.

Edad: La sección ha sido asignada al Eoceno Medio, zonas de *Globigerapsis kugleri* y *Globorotalia lehneri* (Bermúdez y Gámez, 1966). Jam y Méndez señalan que las especies *Gumbelina goodwini*, *Nonion micrus* y *Bolivina taylori*, son características del Eoceno Medio. Muñoz considera que toda la sección es turbidítica, y que gran parte de la fauna es redepositada, y asigna la secuencia al Eoceno Medio superior - zona de *Truncorotaloides rohri* - en base a la fauna contenida en lutitas que parecen ser realmente pelágicas, no redepositadas.

El conjunto floral de la base y parte media de la formaciones de edad Eoceno Medio, limite entre las zonas NP15 y NP16 de Martini 1971, zonas de *Chiphragmalithus alatus* y *Discoaster tani nodifer*. Perch-Nielsen 1985, ubica la muestra en la zona de *Nannotetrina fulgens*, que incluye la zona NP15 y la base de NP16. En la parte superior el conjunto floral indica una edad comprendida entre el Eoceno Medio y el Tardío, zonas NP16 y NP20 de Martini 1971, zonas de *Discoaster tani nodifer* y *Sphenolithus pseudoradians* Castro (*op. cit.*).

Paleoambientes: La secuencia fue depositada en ambiente marino profundo de mar abierto, en condiciones de inestabilidad tectónica.

Correlación: El intervalo es equivalente a parte de la Formación Pampatar, y posiblemente a la sección Eocena presente en el subsuelo de la isla de Cubagua. Se correlaciona también con parte de la Formación Caratas, de Venezuela oriental, y con las formaciones Navet de Trinidad y Scotland, de Barbados.

© **M. I. Muñoz, 1987**

Referencias

Bermúdez, P. J. y H. A. Gámez, 1966. Estudio paleontológico de una sección del Eoceno. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 26(75): 205-259.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 58(8): 689-702.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Jam, P. y A. Méndez, 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Kugler, H. G., 1957. Contribution to the geology of the islands Margarita and Cubagua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 68(5): 555-566.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Muñoz, N. G., 1973. Geología sedimentaria del flysch eoceno de la isla de Margarita (Venezuela). *Revista GEOS*. Caracas, 20: 5-64.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 838-893.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)