

CRETACICO (Aptiense - Albiense)

Estados Sucre y Monagas

Referencia original: Guillaume, H. A. Bolli, H. M. Beckmann, J. P., 1972.

Consideraciones históricas: Guillaume y otros (1972) utilizan este nombre, para definir un desarrollo local de arenas que llegan a predominar lateralmente sobre la alternancia típica de la Formación El Cantil.

Localidad tipo: En los alrededores del pueblo de Sabana de Piedra, al norte de Caripe, estado Monagas en el núcleo del anticlinal de Cerro Negro.

Descripción litológica: En su sección tipo es una arenisca de grano fino, localmente grueso, con cemento calcáreo, blanca, con manchas de limonita, de estratificación delgada, localmente con estratificación de corrientes, con laminas y capas de lutita micácea negra.

Espesor: En su localidad tipo mide 170 m.

Contactos: Suprayace a la Formación García y pasa transicionalmente a la Caliza del Guácharo de la Formación El Cantil.

Extensión geográfica: Se reporta su presencia al norte de Caripe, estado Monagas y en las cabeceras del río Guarapiche, al Sureste de Cumanacoa.

Paleontología: Las areniscas y lutitas contienen restos de plantas y foraminíferos, índices de facies.

Edad: No se reportan fósiles indicativos de edad. Por suprayacer a la Formación García e infrayacer a la Formación Chimana, se puede ubicar en el lapso Aptiense Superior - Albiense Medio.

Correlación: Equivalente lateral de la sección inferior de la Formación El Cantil.

Una arenisca similar, ocupa la misma posición estratigráfica en los alrededores de Guariquén, y se ha llamado Arenisca de Hormiguera.

© *Sin Autor, 1997*

Referencias

Guillaume, H. A. Bolli, H. M. Beckmann, J. P., 1972. Estratigrafía de Cretáceo Inferior de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela, *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas noviembre, 1969, memoria, Bol. Geol. Caracas. Publ. Esp. 5, 3: 1619-1665.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)