

CUATERNARIO (Pleistoceno)

Dependencias Federales (Isla de Aves)

Referencia original: J. Pantin H., 1972, p. 75.

La Formación Isla de Aves, se puede dividir en dos unidades: Una unidad representada por la Calcarenita de Isla de Aves la cual parece corresponder a el afloramiento de los sedimentos moderadamente consolidados y litificados de las calizas formadas durante la transgresión marina del interglacial Sangamon (Pleistoceno tardío). Otra unidad representada por la Caliza de El Mástil y el arrecife frangeante y rocas de playa que bordean a la isla, así como los sedimentos no consolidados, formados por las arenas calcáreas, que se encuentran en la superficie de la isla. Esta última unidad es del Holoceno.

Pantin (1972, p. 75) indica que la Caliza de El Mástil se encuentra, principalmente en la parte norte de la isla, y está formada por arena calcárea sin estratificación o pobre estratificación, con abundantes cantos y bloques de coral de diferentes especies, caparazones de diversos moluscos, etc. Entre los corales se pueden identificar: *Acropora palmata*, fragmentos de *Acropora cervicornis*, *Diplorias*, *Siderastreas*, *Montastreas*, etc. La Caliza El Mástil se ha formado por transporte normal de sedimentos calcáreos no consolidados por el oleaje, principalmente durante estados de tormenta. Este mismo proceso acarrea los fragmentos de corales sobre la superficie de la isla. El espesor mínimo de la Caliza de El Mástil es de casi 2 m, descansa discordantemente sobre la superficie erosionada de la Calcarenita de Isla de Aves (Pantin, 1972).

Véase [ISLA DE AVES, Formación](#).

© José Méndez Baamonde, 1997

Referencias

Pantin, H. J., 1972. Nuevas observaciones geológicas acerca de la Isla de Aves, Venezuela: Mem., *VI Conf. Geol. Caribe*, p. 74-78.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)